



# Sujet Des Examens

## SMAi3

exosup.com

*Clubnajah2013@gmail.com*  
*www.clubnajah.blogspot.com*  
*www.facebook.com/succes.club*

2015-2016

**EXAMEN DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
19 Janvier 2015 - Durée : 1 H 30 mn

**N.B. :**

- Les trois (3) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants!
- La propreté de la copie sera prise en compte dans la note finale.

**Exercice 1.** Soit  $X$  une variable aléatoire binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ . Et soit la variable aléatoire  $Y = \frac{1}{X+1}$ .

1. Rappeler la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ .
2. Rappeler la formule du binôme de Newton  $(a + b)^n$ .
3. Calculer l'Espérance Mathématique de la variable aléatoire  $Y$ .

**N.B. :** Faire le changement d'indices qui permet de faire le calcul de  $E(Y)$ !!

**Exercice 2.** La Direction d'une société *multinationale* s'est intéressée au nombre d'accidents par jour survenant dans un de ses sites de fabrication.

Les statistiques dont elle dispose pour 150 jours d'observation au cours d'une certaine période sont données dans le tableau suivant :

Nombre d'accidents	0	1	2	3	4
Nombre de jours	61	55	25	7	2

On suppose que le nombre d'accidents par jour suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$ .

1. Rappeler la loi de probabilité d'une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ .
2. Quelles sont l'Espérance Mathématique et la Variance d'une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ ? **On ne demande pas de refaire les calculs!!!**
3. Ne connaissant pas  $\lambda$ , la Direction a utilisé les données du tableau ci-dessus pour l'estimer. Quelle est l'estimation à proposer pour le paramètre  $\lambda$ ? Justifier la réponse et donner le résultat avec un seul chiffre après la virgule.
4. D'après les données du tableau, qu'est-ce qui permet de rassurer la Direction dans le choix de la loi de Poisson pour modéliser la variable aléatoire "Nombre d'accidents par jour" ?
5. Calculer alors la probabilité qu'il y ait plus de quatre (4) accidents par jour sur le site en question.

**Exercice 3.** Soit un couple aléatoire  $(X, Y)$  de densité de probabilité conjointe :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\cos(x-y)}{2} & \text{si } (x, y) \in [0; \frac{\pi}{2}] \times [0; \frac{\pi}{2}], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Donner les lois marginales associées au couple aléatoire  $(X, Y)$ .
2. Est-ce que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ?
3. Calculer  $E(X)$  et  $E(Y)$ , respectivement Espérances Mathématiques de  $X$  et de  $Y$ .
4. Calculer  $V(X)$  et  $V(Y)$ , respectivement variances de  $X$  et de  $Y$ .
5. Calculer  $Cov(X, Y)$ , covariance du couple aléatoire  $(X, Y)$ .

\*\*\*\*\*

Bon courage

\*CLUB ELJADIDA\*  
UCD.FS-ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

Examen: Electromagnétisme: Filière : SMA3

Durée : 1h 30 min

**Exercice 1 : (10 pts)**


**Amélioration du facteur de puissance.**

Un abonné de l'ONE dispose d'une source tension sinusoïdale de fréquence **50 Hz** et de valeur efficace  **$U=220V$** . Il branche un appareil de chauffage (non inductif) qui est représenté par la résistance ( **$R$** ). Ensuite ; il branche un moteur inductif (modélisable par une résistance  **$R$**  en série avec une inductance  **$L$** ) en parallèle avec la résistance ( **$R$** ).

Voir le circuit suivant pour lequel on donne :

$$u(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$$

$$r = 50\Omega, ; L = \frac{1}{2\pi} H ; R = 100\Omega,$$



1. Déterminer entièrement les intensités des courants :

$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi), \quad i_1 = I_{m1} \cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad i_2 = I_{m2} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

2. Déterminer les puissances moyennes :

$$P, \quad P_1 \quad \text{et} \quad P_2$$

L'ONE recommande d'améliorer le facteur de puissance. Pour cela on ajoute un condensateur ( **$C$** ) en dérivation avec l'ensemble (Moteur et Resistance).

3. Donner le schéma du nouveau circuit.

4. **En utilisant la représentation de Fresnel ;** Donner la valeur de la capacité ( **$C$** ) qui permet d'obtenir un facteur de puissance égal à 1 ?  $\cos(\varphi) = 1$

5. Déterminer les puissances moyennes :

$$P ; \quad P_1 ; \quad P_2 \quad \text{et} \quad P_3$$

\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

## Exercice 2 : (10 pts)

### I. Spire circulaire

On considère une spire de centre  $O$  et de rayon  $R$  parcouru par un courant  $I$ . (Schéma 1)

- 1- Quelles sont les propriétés de symétrie et d'invariance de cette distribution de courant ?
- 2- Déterminer le champ magnétique  $\vec{B}$  créé au centre  $O$  de la spire.




Schéma 1





Schéma 2

- 3- Déterminer le champ magnétique  $\vec{B}$  créé en un point  $M(z)$  de son axe ( $\vec{e}_z$ ). (Schéma 2)
- 4- Retrouver l'expression de  $\vec{B}_0$  ( $M = 0$ ). Tracer l'allure de  $B(z/R)/B_0$  en fonction de  $z/R$ .
- 5- En déduire l'expression du champ magnétique  $\vec{B}(z)$  créé en un point  $M(z)$  de son axe ( $\vec{e}_z$ ) par une bobine plate comportant  $N$  spires de rayon  $R$ , parcourue par un courant  $I$ .

### II. Solénoïde circulaire

Soit un solénoïde (bobine cylindrique) de rayon  $R$  de longueur  $L$ , comportant  $N$  spires jointives par unité de longueur, parcourue par un courant  $I$ .

- 1- En utilisant le résultat de la question 5°, calculer le champ magnétique créé par ce solénoïde en un point  $M(z)$  de son axe ( $\vec{e}_z$ ).
- 2- En déduire l'expression du champ magnétique créé par un solénoïde de rayon  $R$  et de longueur supposée infinie en un point  $M(z)$  de son axe ( $\vec{e}_z$ ).
- 3- Retrouver ce dernier résultat par application du théorème d'Ampère.





**Examen**  
(Durée : 1h30)

**1) Somme récurrente**

Ecrire un programme en langage C qui lit un entier n et un réel x puis calcule et affiche la somme S suivante :

$$S = 1 + x^1/1! + x^2/2! + \dots + x^{(n-2)}/(n-2)! + x^{(n-1)}/(n-1)! + x^n/n!$$

**2) Tableau et fonctions**

Ecrire en langage C les fonctions suivantes :

1. la fonction qui lit un tableau à n éléments ( $1 \leq n \leq 100$ ), de type entier,
2. la fonction qui calcul l'indice du premier plus grand élément du tableau T,
3. la fonction qui insère un élément dans une position donnée, dans le tableau T,
4. la fonction qui supprime un élément d'une position donnée, du tableau T,
5. la fonction qui calcul la somme de tout les éléments du tableau T élevés au carré.
6. la fonction qui affiche les éléments du tableau T.
7. la fonction principale qui utilise les fonctions ci-haut, pour lire un tableau donné par l'utilisateur, l'afficher, puis élever au carré les éléments du tableau, l'afficher de nouveau, ensuite classer les éléments du tableau par ordre croissant, et enfin l'afficher classé.

**3) Structures et chaînes de caractères**

Nous utiliserons pour représenter des heures d'une journée au format hh : mm le type Struct temps :

```
struct temps
{
    char jour[20]; /* le champ jour devra contenir un jour de la semaine :
                    Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi ou Dimanche */
    int heure;     // le champ heure devra contenir une valeur de 0 à 23
    int minute;    // le champ minute devra contenir une valeur de 0 à 59.
};
```

Ecrire un programme en C qui déclare trois variables t1, t2 et t3 de type struct temps en utilisant la structure ci-haut. Le programme demande à l'utilisateur de donner un jour de la semaine, puis deux temps en minutes de cette même journée, et les met dans les variables t1 et t2. Le programme calcule ensuite la somme de t1 et t2 et met le résultat dans t3, et affiche les trois temps selon le format : jour hh:mm. (Attention le jour peut changer si la somme dépasse 23:59).

**Facultatif**

Proposer un programme en C qui lit dix phrases (chaînes de caractères) de tailles différentes (minimum 3 caractères, maximum 300 caractères). Les 10 chaînes seront stockées dans un tableau de 10 pointeurs, en réservant dynamiquement l'emplacement en mémoire pour chaque chaîne. Le programme classe ensuite par ordre alphabétique (sur les 3 premiers caractères) les 10 chaînes dans le tableau. Enfin, il les affiche sur l'écran en indiquant le nombre de mots de chaque phrase.

**Examen d'analyse 4,**  
**Durée, 1h30, SMA3**

**Exercice 1:** On considère la suite de fonctions  $(f_n)$  définies sur  $[0, 1]$ , par récurrence sur  $n$  par,

$$f_0(x) = 0 \text{ et pour } n \in \mathbb{N}, f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{1}{2}(x - f_n(x))$$

a) Calculer les premiers éléments  $f_1(x)$ ,  $f_2(x)$  et  $f_3(x)$  de la suite  $(f_n)$ .

b) Montrer par récurrence sur  $n$ , que  $f_n$  est une fonction polynômiale vérifiant la propriété suivante,

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq f_n(x) \leq \sqrt{x}$$

c) En déduire que  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par  $f(x) = \sqrt{x}$ .

d) Etablir par récurrence sur  $n$  la relation suivante,

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq \sqrt{x} - f_n(x) \leq \frac{2\sqrt{x}}{2 + n\sqrt{x}}$$

e) En déduire que  $(f_n)$  converge uniformément vers la fonction  $f$  sur  $[0, 1]$ .

**N.B.:** Pour la question d), on pourra remarquer que:

$$1 - \frac{1}{2}(\sqrt{x} + f_n(x)) \leq \frac{2 + (n-1)\sqrt{x}}{2 + n\sqrt{x}}$$

et que

$$(2 + (n-1)\sqrt{x})(2 + (n+1)\sqrt{x}) \leq (2 + n\sqrt{x})^2$$

**Exercice 2 :** Soit  $f(x) = \sum_2 a_n x^n$ , une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ .

a) Montrer que la série  $g(x) = \sum_2 \frac{n}{n^2+n-2} a_n x^n$  a même rayon de convergence que celui de  $f$ .

b) Montrer que

$$\frac{d}{dx} \left( g'(x) + \frac{2g(x)}{x} \right) = \frac{1}{x} f'(x)$$

c) **Application:** Calculer le rayon de convergence et la somme de la série de terme générale

$$f_n(x) = \frac{1}{n^2 + n - 2} x^n, \quad n \geq 2$$

d) Retrouver le résultat précédent en décomposant  $\frac{1}{n^2+n-2}$  en éléments simples.

**Exercice 3:** a) Montrer que la fonction suivante  $f(x) = \frac{1}{2+x}$ , pour  $x$  réel, est développable en série entière au voisinage de  $x = 0$ .

b) Montrer que si  $p$  est un entier positif, on a,

$$\int_0^1 \frac{x^p}{2+x} dx = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{2^n (n+p+1)}$$

c) En déduire la somme de la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^n (n+4)}$$

Examen d' Algèbre 4  
Durée 1h 30, Niveau: SMA3

**Exercice 1:** Soient  $E$  un  $K$  - espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 2$  et  $f$  un endomorphisme de  $E$ .

1) Vérifier que si  $x$  est un vecteur propre de  $f$  alors  $K.x$  est  $f$  - stable.

Dans la suite, on suppose que  $\{0\}$  et  $E$  sont les seuls sous espaces stables par  $f$ .

2) Montrer que  $f$  ne possède pas de valeurs propres non nulles.

3) Soient  $x$  un vecteur non nul de  $E$  et  $C_x = \text{vect} \{f^i(x), i \in \mathbb{N}\}$

a) Montrer que  $C_x$  est  $f$  - stable et que  $C_x = E$

b) En déduire que  $B_x := \{x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\}$  est une base de  $E$ .

c) Donner la forme de la matrice  $A$  de  $f$  relativement à la base  $B_x$

d) Soient  $y$  un vecteur non nul de  $E$  et  $B$  la matrice de  $f$  relativement à la base  $B_y$ . Dire pourquoi les polynômes caractéristiques de  $A$  et de  $B$  sont égaux et en déduire que  $A = B$ .

e) Soit  $g$  un endomorphisme de  $E$  qui commute avec  $f$ . Exprimer  $g(x)$  dans la base  $B_x$  et en déduire que  $g \in K[f]$ .

**Exercice 2:** Soit  $A$  la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Montrer que  $\text{sp}(A) = \{1, 2\}$ .

2) Trouver les sous espaces propres de  $A$ .  $A$  est - elle diagonalisable ?

3) Déterminer les sous espaces caractéristiques de  $A$ .

4) Jordaniser  $A$ .

5) Soit

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer  $\exp(tB)$ , pour  $t \in \mathbb{R}$

6) Résoudre le système

$$\begin{cases} x' = x + z \\ y' = -x + 2y + z \\ z' = x - y + z \end{cases}$$



**EXAMEN D' ANALYSE 5** (Session normale)

(Durée 1H 30mn)

**EXERCICE 1 :**

On note par  $E$  l'ensemble des polynômes à coefficients réels  $R[X]$ .

Si  $P(X)=a_0+a_1X+\dots+a_nX^n$  on pose

$$\|P\|_1 = |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n| \quad \text{et} \quad \|P\|_\infty = \max(|a_0|, |a_1|, \dots, |a_n|).$$

1°) Montrer que  $\| \cdot \|_1$  et  $\| \cdot \|_\infty$  sont deux normes de  $E$ .

2°) Montrer que  $\| \cdot \|_1$  n'est pas équivalente à  $\| \cdot \|_\infty$  (Indication:  $Q_n(X)=1+X+X^2+\dots+X^n$ ).

3°) Soit  $N$  une norme quelconque de  $E$ , Si  $P(X)=a_0+a_1X+\dots+a_nX^n$  on pose

$$\|P\|_N = N(P) + N(P') + \dots + N(P^{(n)}). \quad (P^{(n)} \text{ est la dérivée d'ordre } n \text{ de } P).$$

Montrer que  $\| \cdot \|_N$  est une norme de  $E$ .

4°) On considère l'application  $D$  de  $E$  dans  $E$  définie par  $D(P)=P'$

a) Montrer que  $D$  est une application linéaire.

b) Si on muni  $E$  de la norme  $\| \cdot \|_1$ ,  $D$  est elle continue ?

c) Si on muni  $E$  de la norme  $\| \cdot \|_\infty$ ,  $D$  est elle continue ?

d) Montrer que  $D$  est continue si on muni  $E$  de la norme  $\| \cdot \|_N$ .

e) Calculer la norme subordonnée à la norme  $\| \cdot \|_N$  de  $D$  ( $\| D \|_N$ )

5°) On note par  $F$  l'ensemble des fonctions de classe  $C^\infty$  de  $R$  dans  $R$

On considère l'application  $D$  de  $F$  dans  $F$  définie par  $D(f)=f'$ .

On muni  $F$  d'une norme  $N$ . Montrer que  $D$  n'est pas continue.

(indication : On peut considérer la fonction  $f(x)=e^{\alpha x}$ )

6°) Etudier la différentiabilité de  $D$ .

\*CLUB NAJAH\*  
 UCD.FS.ELJADIDA  
 LE PRESIDENT

## EXERCICE 2

Soit  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$ . On cherche les fonctions  $f \in C^1(D, \mathbb{R})$  qui vérifient l'équation :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (I)$$

1°) Vérifier que  $\phi(x, y) = \frac{y}{x}$  est une solution de (I)

2°) Soit  $g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Montrer que  $g \circ \phi$  est une solution de (I).

3°) On pose  $\psi(u, v) = (u, uv)$ . Montrer que  $\psi$  est un  $C^1$  difféomorphisme de  $D$  dans  $D$ .

4°) Soit  $f$  une solution de (I). Montrer que  $F(u, v) = f \circ \psi(u, v)$  ne dépend que de  $v$ .

5°) En déduire l'ensemble des solutions de (I).

## EXERCICE 3

On se propose de calculer la distance d'un point  $A = (a, b, c)$  à la sphère  $S_1$  d'équation  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  par la méthode des extremums liés.

Soit  $M = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On pose

$$f(x, y, z) = (\text{distance}(A, M))^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \quad \text{et} \quad g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

1°) Chercher les extremums de la fonction  $f(x, y, z)$  liés par la contrainte  $g(x, y, z) = 0$

2°) Etudier la nature des extremums trouvés dans 1°).

3°) Donner la formule de la distance du point  $A$  à la sphère  $S_1$ .

4°) Retrouver le résultat géométriquement.

## Examen de rattrapage

(Durée : 1h30)

### 1) suite récurrente

Ecrire un programme en langage C qui lit un entier  $n$  puis calcule et affiche le terme  $n$  de la suite récurrente suivante :

$$U(0)=1$$

$$U(1)=2$$

$$U(n)=n.U(n-1)+(n+1).U(n-2)+n$$

+CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

### 2) Fonctions

On veut convertir un nombre décimal en binaire (mot de 8 bits) selon la méthode suivante:


Premièrement : tant que le nombre décimal est différent de zéro, on le divise par deux et on met le reste de la division dans un tableau (de taille 8).

Deuxièmement : on inverse les éléments du tableau.

1. Ecrire une fonction *metazero* qui met à zéro les éléments d'un tableau.
2. Ecrire une fonction *inverser* qui permet d'inverser les éléments d'un tableau.
3. Ecrire une fonction *convertir* qui permet de convertir un nombre décimal en binaire en utilisant les deux fonctions précédentes.
4. Ecrire une fonction *affiche* qui affiche les éléments d'un tableau sur une ligne et sans espaces.
5. Ecrire le programme principal qui demande un nombre et l'affiche en binaire 8bits

Exemple:

le nombre 13 vaut  
00001101 en binaire



Les prototypes des fonctions:

void metazero(int \*tab, int nb);

void inverser(int \*tab, int nb);

void convertir (int dec, int \*tab, int nb);

void affiche (int \*tab, int nb);

(nb est le nombre d'éléments du tableau. nb = 8)

### 3) Structures

Ecrire un type « Struct point » pour déclarer des points du plan cartésien oxy. Cette structure contient donc trois variables : un réel  $x$  pour la l'abscisse, un réel  $y$  pour l'ordonnée et un caractère  $c$  pour le nom du point.

Ecrire un programme principal en C qui déclare trois points  $p1$ ,  $p2$  et  $p3$  de type struct point. Le programme demande à l'utilisateur de donner les coordonnées et les noms des points  $p1$  et  $p2$ , puis calcule  $p3$  de nom S, comme étant la somme (la résultante) des points  $p1$  et  $p2$ . Enfin, il affiche  $p1$ ,  $p2$  et  $p3$ .

### 4) Matrices

Ecrire un programme en langage C qui lit une matrice  $A$  carrée quelconque de taille  $5 \times 5$  et vérifie si cette matrice est égale ou elle est différente de la matrice  $B$  suivante :

Il affiche « oui » si la matrice  $A == B$

Il affiche « non » si la matrice  $A != B$

1	3	3	3	3
5	1	3	3	3
5	5	1	3	3
5	5	5	1	3
5	5	5	5	1

### 5) Facultatif

Ecrire un programme en langage C qui lit une matrice  $M$  de taille  $256 \times 256$  et qui affiche combien de fois on trouve la matrice  $B$  de l'exercice 4 dans la matrice  $M$ .

**EXAMEN DE RATRAPAGE**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
Mercredi 18 Février 2015 - Durée : 1 Heure 30mn

N.B. :

- Les quatre (4) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants !
- Les tables statistiques jointes sont celle de la loi normale centrée-réduite et de Student.

**Exercice 1. Question de cours :**

Rappeler pour un couple aléatoire  $(X; Y)$  à densité de probabilité conjointe, notée  $f$ , la définition du coefficient de corrélation. On précisera autant que possible les notations utilisées.

**Exercice 2.** Dans une population donnée, la proportion de personnes atteintes d'une maladie  $M$  a été estimée à 15%. Un test  $T$  a été mis au point ; sa sensibilité est de 94% (probabilité d'être positif pour une personne malade) et sa spécificité est de 98% (probabilité d'être négatif pour une personne non malade).

1. Une personne a subi le test  $T$ , et il s'est révélé positif. Quelle est la probabilité que la dite personne soit réellement atteinte de la maladie  $M$  ?
2. Une deuxième personne a subi elle aussi le test  $T$ , celui-ci est négatif. Quelle est la probabilité que cette personne soit atteinte de la maladie  $M$  ?

**Exercice 3.** Soit la variable aléatoire  $X \simeq N(64; 8)$  (loi normale de paramètres  $\mu = 64$  et  $\sigma = 8$ ).

1. Calculer la probabilité que  $X$  soit comprise entre 50,5 et 81,5.
2. Peut-on considérer que le calcul de la probabilité ci-dessus est une approximation de la loi de Poisson par une loi Normale ? Justifier la réponse, et donner le paramètre de la loi de Poisson.
3. Donner les entiers  $n_1$  et  $n_2$  entre lesquels varie strictement la loi de Poisson en question.

**Exercice 4.** Une société multinationale désire mettre sur le marché un nouveau produit ; une étude de faisabilité, réalisée auprès d'un échantillon de 121 clients potentiels, a permis d'avoir les données présentées sous la forme du tableau suivant :

Intervalles	[7;11]	[11;15]	[15;19]	[19;23]	[23;27]	[27;31]	[31;35]
Effectifs	5	16	23	32	21	$n_6$	6

N.B. : On notera  $X$  la variable aléatoire d'intérêt. Les résultats seront donnés avec trois (3) chiffres après la virgule.

1. Donner la valeur de  $n_6$ .
2. Estimer le mode de cette série statistique.
3. Estimer la médiane de cette série statistique.
4. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la moyenne théorique, notée  $\mu$ , de la variable aléatoire  $X$ .
5. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance théorique, notée  $\sigma^2$ , de la variable aléatoire  $X$ .
6. Donner l'intervalle de confiance à 95% pour la moyenne théorique.
7. Soit  $p$  la proportion de clients prêts à payer un montant entre 19 et 31. Donner l'intervalle de confiance à 93% pour la proportion  $p$ .


\*\*\*\*\*

Bon courage

## I Loi Normale

$$F(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

\*CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT




$u$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7290	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9779	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

$u$	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	4,5
$F(u)$	0,99865	0,99904	0,99931	0,99952	0,99966	0,99976	0,999841	0,999928	0,999968	0,999997



Table 4

## Loi de Student



$\alpha$	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001
$1 - \alpha$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99	0,998	0,999
$v = \text{ddl}$											
1	0,0000	0,3249	0,7265	1,3764	3,0777	6,3137	12,706	31,821	63,656	318,29	636,58
2	0,0000	0,2887	0,6172	1,0607	1,8858	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	22,328	31,600
3	0,0000	0,2767	0,5844	0,9786	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	10,214	12,924
4	0,0000	0,2707	0,5686	0,9410	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	7,1729	8,6101
5	0,0000	0,2672	0,5594	0,9195	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5,8935	6,8686
6	0,0000	0,2648	0,5534	0,9057	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,2075	5,9587
7	0,0000	0,2632	0,5491	0,8960	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	4,7853	5,4081
8	0,0000	0,2619	0,5459	0,8889	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	4,5008	5,0414
9	0,0000	0,2610	0,5435	0,8834	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,2969	4,7809
10	0,0000	0,2602	0,5415	0,8791	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,1437	4,5868
11	0,0000	0,2596	0,5399	0,8755	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,0248	4,4369
12	0,0000	0,2590	0,5386	0,8726	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	3,9296	4,3178
13	0,0000	0,2586	0,5375	0,8702	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	3,8520	4,2209
14	0,0000	0,2582	0,5366	0,8681	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	3,7874	4,1403
15	0,0000	0,2579	0,5357	0,8662	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	3,7329	4,0728
16	0,0000	0,2576	0,5350	0,8647	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	3,6861	4,0149
17	0,0000	0,2573	0,5344	0,8633	1,3334	1,7386	2,1098	2,5669	2,8982	3,6458	3,9651
18	0,0000	0,2571	0,5338	0,8620	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,6106	3,9217
19	0,0000	0,2569	0,5333	0,8610	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,5793	3,8833
20	0,0000	0,2567	0,5329	0,8600	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,5518	3,8496
21	0,0000	0,2566	0,5325	0,8591	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,5271	3,8193
22	0,0000	0,2564	0,5321	0,8583	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,5050	3,7922
23	0,0000	0,2563	0,5317	0,8575	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,4850	3,7676
24	0,0000	0,2562	0,5314	0,8569	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	3,4668	3,7454
25	0,0000	0,2561	0,5312	0,8562	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,4502	3,7251
26	0,0000	0,2560	0,5309	0,8557	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,4350	3,7067
27	0,0000	0,2559	0,5306	0,8551	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,4210	3,6895
28	0,0000	0,2558	0,5304	0,8546	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,4082	3,6739
29	0,0000	0,2557	0,5302	0,8542	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,3963	3,6595
30	0,0000	0,2556	0,5300	0,8538	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,3852	3,6460
40	0,0000	0,2550	0,5286	0,8507	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,3069	3,5510
50	0,0000	0,2547	0,5278	0,8489	1,2987	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778	3,2614	3,4960
60	0,0000	0,2545	0,5272	0,8477	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,2317	3,4602
70	0,0000	0,2543	0,5268	0,8468	1,2938	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479	3,2108	3,4350
80	0,0000	0,2542	0,5265	0,8461	1,2922	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387	3,1952	3,4164
90	0,0000	0,2541	0,5263	0,8456	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316	3,1832	3,4019
100	0,0000	0,2540	0,5261	0,8452	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259	3,1738	3,3905
200	0,0000	0,2537	0,5252	0,8434	1,2858	1,6525	1,9719	2,3451	2,6006	3,1315	3,3398
$\infty$	0,0000	0,2533	0,5244	0,8416	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0903	3,2906



**Exercice 1 : (10 pts) : Théorèmes de Thévenin et de Norton**

On considère le circuit représenté ci-contre.

On donne :  $e(t) = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$   
 $R = 40\Omega$ ,  $L_1 = \frac{1}{2\pi} H$ ,  $C = 5\mu F$

1. Déterminer les expressions de  $\underline{E}_{th}$  et  $\underline{Z}_{th}$  du modèle de **Thévenin** entre les points **A** et **B**.

2. Si on branche entre A et B une bobine réelle.

$L_2 = \frac{100}{\pi} H$  ; déterminer l'expression du courant :


$i_2(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$

3. Déterminer les expressions de  $\underline{I}_{Nor}$  et  $\underline{Z}_{Nor}$  du modèle de **Norton** entre les points **A** et **B**.

4. Retrouver l'expression du courant :

$i_2(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$  Si on branche entre A et B la

bobine  $L_2 = \frac{100}{\pi} H$



**Exercice 2 : (10 pts) Champs  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  créés par un conducteur cylindrique plein.**

On considère un fil conducteur de longueur supposée infinie et de section circulaire (de rayon  $R$ ). Ce fil est parcouru par un courant ( $I$ ) et de densité  $\vec{J}$  supposée uniforme :

$$\vec{J} = \begin{cases} J \vec{e}_z, & \text{pour } r \leq R \\ \vec{0}, & \text{pour } r > R \end{cases}$$

On exprimera les champs  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  dans la base des coordonnées cylindriques :  $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$

1. Quels sont les propriétés de symétries et d'invariances de cette distribution de courant.

2. Quelle est la forme des lignes de champ de  $\vec{B}$  ?

3. Par application du **Théorème d'Ampère**, déterminer les expressions du champ  $\vec{B}$  :

$\vec{B}_{ex}$  (pour  $r > R$ ) et  $\vec{B}_{in}$  (pour  $r \leq R$ ).

4. Etudier la continuité du champ  $\vec{B}$  au point  $r = R$ .

5. Etablir la relation qui relie le flux de  $\vec{B}$  et la circulation du potentiel vecteur  $\vec{A}$ .

6. En déduire les expressions du potentiel vecteur  $\vec{A}$  :

$\vec{A}_{ex}$  (pour  $r > R$ ) et  $\vec{A}_{in}$  (pour  $r \leq R$ ).

Prendre le potentiel de référence nul à une distance donnée du fil,

par exemple  $A_z(r = 0) = 0$ .

7. Représenter les graphes de  $B$  et de  $A$

**EXAMEN D' ANALYSE 5** (Session de rattrapage)

(Durée 1H 30mn)

**EXERCICE 1 :** On note par  $E_n$  l'ensemble des polynômes à coefficients réels  $R_n[X]$ . Si  $P(X)$  est un élément de  $E_n$  on pose  $\|P\|_n = |P(0)| + |P(1)| + \dots + |P(n)|$ .

1°) Montrer que  $\|\cdot\|_n$  est une norme de  $E_n$  pour  $n=2$  et  $n=3$ .

2°) On considère l'application  $D$  de  $E_2$  dans  $E_3$  définie par  $D(P) = X^2 P$

Montrer que  $D$  est une application linéaire continue.

3°) Calculer la norme subordonnée de  $D$  ( $\|D\|_n$ )

**EXERCICE 2 :** Déterminer les fonctions  $f$  de  $R^2$  dans  $R$  de classe  $C^1$  qui vérifie

simultanément les équations suivant :

$$\begin{cases} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = -1 \end{cases}$$

+CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

**EXERCICE 3 : 1°)** Soit  $K$  un compact de  $R^n$ . Soit  $f$  une application de  $K$  dans  $R$ .

a) Montrer que si  $f$  est continue alors elle admet au moins un maximum global et un minimum global sur  $K$ .

b) Montrer que si  $f$  est classe  $C^1$  et que si  $f$  admet uniquement deux point critiques alors l'un est maximum global et l'autre est un minimum global

2°) a) Déterminer les points critiques de la fonction  $f(x,y,z) = x+y+z$  dans

L'ellipsoïde  $G$  d'équation  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{6} = 1$

b) En déduire le maximum global et le minimum global de la fonction  $f$  dans l'ellipsoïde  $G$

3°)a) Déterminer les points critiques de la fonction  $f(x,y,z)=x+y+z$  dans

L'hyperboloïde  $H$  d'équation  $-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{6} = 1$ .

b) Etudier la nature des deux points critiques

c) On considère le chemin  $\phi(t)=(t,2,t\sqrt{3})$  avec  $t \in \mathbb{R}$ .

i) Montrer que pour tout  $t$  dans  $\mathbb{R}$   $\phi(t)$  est dans l'hyperboloïde  $H$ .

ii) En déduire que  $f$  n'admet pas d'extremum global dans  $H$

\*\*\*\*\*

Rattrapage d'analyse 4,  
Durée, 1h30, SMA3

Exercice 1: a) Montrer que la série numérique  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+2)(6n+5)}$  est convergente et que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+2)(6n+5)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}.$$

b) Calculer le rayon de convergence de la série entière suivante

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{3n+2}}{3n+2}$$

et montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 1, x < 1} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$$

c) Calculer

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+2)(6n+5)}$$

Ind. on pourra utiliser la formule:

$$\int_0^1 \frac{x dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \left( \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \ln 2 \right)$$

Exercice 2 : Soit  $y$  une fonction réelle de la variable réelle  $x$ . On considère l'équation différentielle

$$(1-x^2)y' - xy = 1 \quad (E)$$

et on suppose qu'il existe une solution de (E) développable en série entière  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , vérifiant  $S(0) = 0$ .

a) Déterminer les coefficients de cette série entière. Quel est le rayon de convergence?

b) On suppose que l'équation (E) possède une unique solution définie sur  $] -1, 1[$  et vérifiant  $y(0) = 0$ . Montrer que

$$\frac{\text{Arc sin } x}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_0^{\infty} a_n x^n$$

c) Déterminer le développement en série entière à l'origine de la fonction

$$f(x) = (\text{Arc sin } x)^2$$

**Exercice 3:** Soit  $f : IR \rightarrow IR$  une fonction intégrable sur  $IR$  et  $\frac{2\pi}{\omega}$ -périodique. On appelle série de Fourier de  $f$ , la série trigonometrique

$$\sum_0^{\infty} [a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x]$$

où  $a_0 = a_0(f) = \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} f(x) dx$ ,  $a_n = a_n(f) = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx$ , pour  $n \neq 0$  et  $b_n = b_n(f) = \frac{\omega}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx$  sont appelés: les coefficients de Fourier de  $f$ .

a) Montrer que si  $f$  est paire, alors  $b_n = 0, \forall n$  et si  $f$  est impaire, alors  $a_n = 0, \forall n$ .

b) On suppose que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\left[-\frac{\omega}{\pi}, \frac{\omega}{\pi}\right]$ . Déterminer les coefficients de Fourier de  $f' : a_n(f')$  et  $b_n(f')$  en fonction de ceux de  $f$ .

c) Soit  $g : IR \rightarrow IR$ , la fonction  $2\pi$ -périodique définie par:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\pi-x}{2} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

i- Montrer que  $g$  est impaire.

ii- Calculer les coefficients de Fourier de  $g$ .

iii- Montrer que  $g$  est développable en série de Fourier.

iv- Etablir la formule

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

Rattrapage d' Algèbre 4  
Durée 1h 30, Niveau: SMA3

**Exercice 1:** Soit  $u$  un endomorphisme d'un  $K$ - espace vectoriel  $E$  de dimension finie  $n$ . On suppose qu'il existe un vecteur  $x_0 \in E$  tel que la famille  $\{x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0)\}$  soit libre. Montrer qu'un endomorphisme  $v$  de  $E$  commute avec  $u$  si et seulement si  $v$  est un polynôme en  $u$ .

**Exercice 2:** Soient

$$J = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 0 & J \\ J & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Calculer  $J^2$ ,  $A^2$  et  $A^3$ . Déduire un polynôme annulateur de  $A$ .  $A$  est-elle diagonalisable?
- 2) Donner un ensemble fini contenant toutes les valeurs propres de  $A$ .
- 3) Quel est le rang de  $A$  et le rang de  $(A - I)$ .
- 4) Donner les valeurs propres de  $A$ .
- 5) En déduire le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de  $A$ .

**Exercice 3:** Soit  $u$  un endomorphisme nilpotent d'indice  $p$  d'un  $K$ - espace vectoriel  $E$  de dimension finie  $n$

- 1) Montrer que  $p = n$  si et seulement si  $rgf = n - 1$ .
- 2) Donner la réduite de Jordan de  $f$  dans les cas: (i)  $rgf = n - 1$ ,  
(ii)  $rgf = n - 2$ .

**Exercice 4:** Soit  $A$  la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

- 1) Montrer que  $sp(A) = \{1, -i, i\}$ .
- 2) Trouver les sous espaces propres de  $A$ .  $A$  est-elle diagonalisable?
- 3) Déterminer les sous espaces caractéristiques de  $A$ .



4) Déterminer la réduite de Jordan  $J$  de  $A$  et la matrice  $P$  telle que  $A = PJP^{-1}$ .

5) Calculer  $\exp(tJ)$ , pour  $t \in \mathbb{R}$

6) Soit l'équation différentielle

$$x^{(4)} - 2x^{(3)} + 2x^{(2)} - 2x' + x = 0 \quad (E)$$

Montrer que  $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  est une solution de l'équation  $(E)$  si et

seulement si  $X = \begin{pmatrix} x \\ x' \\ x^{(2)} \\ x^{(3)} \end{pmatrix}$  est solution du système

$$X' = AX \quad (S)$$

Résoudre le système  $(S)$  et en déduire les solutions de  $(E)$ .

## Examen de rattrapage

SMI3

Algorithmique 2      Durée 1h30

## Exercice 1

On considère une suite  $U_n$  définie par :

$$\begin{cases} U_1 = 1 \\ U_2 = 2 \\ \forall n \geq 3, U_n = U_{n-1} + k * U_{n+2} \end{cases}$$

- 1) Ecrire une fonction récursive SUITE\_U, qui calcule  $U_n$ .
- 2) Ecrire la version itérative de la fonction SUITE\_U.
- 3) En déduire l'algorithme d'une fonction qui vérifie si un entier p donné est un terme de la suite U ou non. Si p est un terme de la suite U, la fonction retournera le rang r de p, sinon elle retournera -1.

## Exercice 2

A et B sont indépendantes

- A- Deux algorithmes A et B passent exactement  $T_A(n) = 0.5n^2 \log_2(n)$  et  $T_B(n) = 1.5n^2$  microsecondes, respectivement, pour un problème de taille de donnée n.
- a- Choisissez l'algorithme, qui est le mieux dans le sens Big-Oh. (justifier votre réponse).
  - b- Quel algorithme choisirez-vous si votre taille de donnée est  $n = 10^{10}$  (justifier votre réponse).
- B- On considère un algorithme dont la complexité  $T(n)$ , pour traiter une taille de donnée n, est donnée par l'équation :

$$T(n) = \frac{2}{n} (T(0) + T(1) + \dots + T(n-1)) + c$$

où  $T(0) = 0$  et c est une constante.

Montrer que  $T(n) = c.n$

\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

### Exercice 3

On considère l'algorithme de recherche dichotomique d'un élément dans un tableau :

```
Fonction RechDicho(L , a)
Entrées : L[1 .. n] une liste triée et a un élément
Sorties : un booléen
Début
    g ← 1
    d ← n
    Tant que      ...      faire
        m ← Ent((d + g)/2)      //partie entière//
        si L[m] < a alors
            ...
        sinon
            ...
        finsi
    fintq
    si      ...      alors
        retourner Vrai
    sinon
        retourner Faux
    finsi
Fin
```

- 1) Compléter l'algorithme en remplissant les pointillés.
- 2) Démontrer la terminaison de cet algorithme.

### Exercice 4

Soit une entreprise qui comporte un nombre fini d'employés. Chaque employé est caractérisé par un code (Numérotation automatique : 1, 2, 3, ...), un nom, un salaire, une catégorie (1-2-3 ou 4), un sexe (homme/femme) et une ancienneté (nombre d'années vécu dans l'entreprise).

- 1) Établir une procédure qui permet la création d'un fichier « c:\employees.dat » contenant les employés. La saisie des employés se terminera par un salaire nul qui ne doit pas être tenu en compte.
- 2) Établir une procédure qui permet d'augmenter les salaires des hommes par un montant égal au double de l'ancienneté et ceux des femmes par un montant égal au quart de l'ancienneté.
- 3) Établir une procédure qui permet de créer un fichier « c:\hommes.dat » comportant les hommes dans l'ordre décroissant des catégories.
- 4) Établir une procédure qui permet d'afficher les employés dont les salaires sont supérieurs à 12000DH.

**Exercice 1**

On se propose de calculer une valeur approchée de la constante  $\pi$  en utilisant la formule suivante :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} \dots$$

Donner l'algorithme d'une fonction permettant de retourner une valeur approchée de la constante  $\pi$  en utilisant la formule ci-dessus et en s'arrêtant lorsque le terme  $\frac{1}{x}$  ( $x = 3$  ou  $5$  ou  $7 \dots$ ) devient inférieur ou égal à une erreur  $\epsilon$  donnée en paramètre ( $\epsilon \in \mathbb{R}$  et  $\epsilon > 0$ ).

**Exercice 2**

On considère l'algorithme de la fonction récursive suivante :

```

Fonction recur(n : entier) : entier
Début
    Si n = 0 Alors Retourner(2)
    Sinon Retourner(recur(n-1)+recur(n-1))
Fin

```

- 1) Donner, en fonction de  $n$ , la complexité dans le pire des cas de la fonction `recur` (justifier votre réponse)
- 2) Si on remplace "`Retourner (recur(n-1)+recur(n-1))`" par "`Retourner (2*recur(n-1))`", la complexité de la fonction `recur` est-elle modifiée ? (justifier votre réponse)

**Exercice 3**

On considère l'algorithme suivant :

```

Algorithme
Var x, y, b : entier
Début
    lire(b)
    lire(x)
    y ← 1
    Tant que b ≠ 0 faire
        si b est impair alors
            y ← x * y
        fin si
        x ← x * x
        b ← b div 2
    finTq
    écrire(y)
Fin

```

- 1) En faisant les traces des exécutions de l'algorithme pour des valeurs de  $b = 1, 2, 3$  et  $4$  montrer que l'algorithme pourra bien fournir le calcul de  $x^b$ .

\*CLUB NAJAH\*  
 UCD-FS-ELJADIDA  
 LE PRÉSIDENT

- 2) Montrer que  $\{yx^b = X^B\}$  est un invariant de boucle. B et X étant les valeurs initiales données aux variables b et x par l'utilisateur.
- 3) Prouver que l'algorithme fournit bien le résultat  $y = x^b$ .

#### Exercice 4

Les données relatives à un concours sont enregistrées dans un fichier intitulé « concours.dat ». Il comporte n enregistrements relatifs aux n candidats. Chaque enregistrement comporte les champs : **numero**(entier); **nom** (chaîne de 30 caractères); **prenom** (chaîne de 30 caractères); **matiere\_1** (chaîne de 30 caractères); **note\_1** (réel); **matiere\_2** (chaîne de 30 caractères); **note\_2** (réel), où **note\_i** est la note obtenue par un candidat dans la matière **matiere\_i**. A partir des données des candidats enregistrées dans le fichier « concours.dat » on veut produire un nouveau fichier, intitulé « resultat.dat », contenant n enregistrements comportant les champs **numero**, **nom**, **prenom**, **moy** et **rang**.

La moyenne d'un candidat (**moy**) est calculée comme suivant :  $(1 * note\_1 + 2 * note\_2) / 3$ . Le rang (**rang**) est le classement du candidat par ordre de mérite (c'est-à-dire suivant un tri décroissant sur les moyennes des candidats).

- 1) Déterminer la procédure **Copier\_Note** qui permet de remplir un tableau T par les moyennes des candidats.
- 2) Déterminer la procédure **Tri\_Décroissant** qui permet de trier le tableau T par ordre décroissant.
- 3) Déterminer la procédure **Création\_Fichier** qui permet de créer le fichier « resultat.dat ».

*N.B : on ne vous demande pas de réer le fichier « concours.dat ». Les notes des candidats doivent être extraites à partir du fichier « concours.dat »*

**EXAMEN DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
19 Janvier 2015 - Durée : 1 H 30 mn

**N.B. :**

- Les trois (3) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants !
- La propreté de la copie sera prise en compte dans la note finale.

**Exercice 1.** Soit  $X$  une variable aléatoire binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ . Et soit la variable aléatoire  $Y = \frac{1}{X+1}$ .

1. Rappeler la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ .
2. Rappeler la formule du binôme de Newton  $(a+b)^n$ .
3. Calculer l'Espérance Mathématique de la variable aléatoire  $Y$ .

**N.B. :** Faire le changement d'indices qui permet de faire le calcul de  $E(Y)$  !!

**Exercice 2.** La Direction d'une société multinationale s'est intéressée au nombre d'accidents par jour survenant dans un de ses sites de fabrication.

Les statistiques dont elle dispose pour 150 jours d'observation au cours d'une certaine période sont données dans le tableau suivant :

Nombre d'accidents	0	1	2	3	4
Nombre de jours	61	55	25	7	2

On suppose que le nombre d'accidents par jour suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$ .

1. Rappeler la loi de probabilité d'une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ .
2. Quelles sont l'Espérance Mathématique et la Variance d'une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ ? On ne demande pas de refaire les calculs!!!
3. Ne connaissant pas  $\lambda$ , la Direction a utilisé les données du tableau ci-dessus pour l'estimer. Quelle est l'estimation à proposer pour le paramètre  $\lambda$ ? Justifier la réponse et donner le résultat avec un seul chiffre après la virgule.
4. D'après les données du tableau, qu'est-ce qui permet de rassurer la Direction dans le choix de la loi de Poisson pour modéliser la variable aléatoire "Nombre d'accidents par jour" ?
5. Calculer alors la probabilité qu'il y ait plus de quatre (4) accidents par jour sur le site en question.

**Exercice 3.** Soit un couple aléatoire  $(X, Y)$  de densité de probabilité conjointe :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\cos(x-y)}{2} & \text{si } (x, y) \in [0; \frac{\pi}{2}] \times [0; \frac{\pi}{2}], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Donner les lois marginales associées au couple aléatoire  $(X, Y)$ .
2. Est-ce que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ?
3. Calculer  $E(X)$  et  $E(Y)$ , respectivement Espérances Mathématiques de  $X$  et de  $Y$ .
4. Calculer  $V(X)$  et  $V(Y)$ , respectivement variances de  $X$  et de  $Y$ .
5. Calculer  $Cov(X, Y)$ , covariance du couple aléatoire  $(X, Y)$ .

\*\*\*\*\*

Bon courage



le 25-06-2013

**Rattrapage**  
**Système d'exploitation**  
**Filière SMI4**  
**Durée 3h**

\*CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

**Questions du cours**

- 1) Dans le système UNIX, les véritables appels système sont effectués à partir
  - d'un programme utilisateur
  - d'une commande shell
  - d'une procédure de la bibliothèque standardSont-ils exécutés en mode administrateur ou en mode utilisateur ?
- 2) Comment sont organisés les fichiers dans le système UNIX ? Un utilisateur peut-il accéder à un fichier d'un autre utilisateur ? Si oui, comment ?
- 3) Citez trois événements qui provoquent l'interruption de l'exécution d'un processus en cours dans le système UNIX.
- 4) Citez deux événements qui empêchent la création des processus avec la fonction `fork()`
- 5) Que fait la fonction `wait()` ?

**Exercice 1**

Soient A, B, C, D, E et F six processus lancés quasi simultanément dans cet ordre avec leurs durées d'exécution (Table ci-dessous). En supposant que ces processus ne font pas d'entrée-sortie, et que leur priorité ne change pas durant l'exécution.

Processus	Temps d'arrivée	Durée d'exécution
A	0	16
B	0	12
C	2	24
D	3	8
E	4	4
F	6	12

- 1) Déterminez les temps de réponse de chaque processus, ainsi que le temps de réponse moyen, en appliquant les disciplines d'ordonnancement suivantes. Ne tenez pas compte du temps de commutation des processus.
  - a. FIFO (premier arrivé premier servi)
  - b. SJF (plus court d'abord).
  - c. Ordonnancement avec priorité ( $P = 1$  priorité maximale), avec :  $P(A) = 5$ ,  $P(B) = 3$ ,  $P(C) = 6$ ,  $P(D) = 2$ ,  $P(E) = 1$ ,  $P(F) = 4$ .
  - d. Tourniquet avec un quantum de 4 secondes (sans priorités).
  - e. Tourniquet avec un quantum de 4 secondes avec priorités. On prendra cette fois-ci  $P(A) = 3$ ,  $P(B) = 2$ ,  $P(C) = 1$ ,  $P(D) = 3$ ,  $P(E) = 3$ ,  $P(F) = 1$ .

## Exercice 2

- a) Donner les commandes Linux associées aux questions suivantes :

1. afficher exactement la chaîne je m'appelle "Toto"
2. créer un fichier vide de nom **Texte 2012** (avec un espace entre Texte et 2012)
3. copier le fichier **/etc/passwd** dans le répertoire **homedir**
4. afficher les fichiers et les répertoires (y compris les fichiers cachés) contenus dans le répertoire **/etc** suivant leur date de dernière modification
5. supprimer tous les fichiers du répertoire **rep** (rep déjà existant et contient des fichiers)
6. créer depuis le répertoire courant le nouveau répertoire **dir** sous le répertoire **rep**
7. afficher les lignes du fichier **fich** qui terminent par la chaîne **123\$**
8. afficher les lignes du fichier **fich** qui terminent par le caractère \
9. lister récursivement tous les fichiers du répertoire courant dont le nom commence par la chaîne **tp**
10. copier la date courante à la suite du contenu du fichier non vide **info** du répertoire courant
11. afficher la 23-ième ligne du fichier **/etc/passwd**

- b) La commande **ls -la rep** produit la sortie suivante :

```
drwxrwxr-x 2 paul staff 512 Oct 13 15:14 .
drwxr-xr-x 8 paul root 512 Sep 23 05:52 ..
-rwx--x--x 1 paul staff 417 Oct 13 19:17 fiche
```

Donner les droits sur les fichiers et les répertoires de ce listage


- c) Quelle est le rôle de la commande suivante : `grep '^r' /etc/passwd`
- d) En fixant la valeur de **umask** à **007**, donner les droits par défaut pour les fichiers
- e) En fixant la valeur de **umask** à **007**, donner les droits par défaut pour les répertoires

### Exercice 3

Complétez le programme suivant de manière qu'il crée l'arborescence illustrée ci-dessous:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
    .....
    .....
    int i, n=3;
    for (i=0; i<n; i++)
        { /* .... */ }
    .....
    .....
    return 0;
}
```



\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRESIDENT

### Exercice 4

On considère 4 processus, A, B, C, D. On suppose que l'exécution des processus nécessite :

Processus	Instant d'arrivée	Temps d'exécution
A	0	7 unités de temps CPU, 3 unités de temps d'E/S et 5 unités de temps CPU
B	1	6 unités de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S, 4 unités de temps CPU
C	7	5 unités de temps CPU
D	10	1 unité de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S et 2 unités de temps CPU

Montrez comment les 4 processus vont utiliser le processeur, en calculant le temps moyen d'exécution, dans chacun des cas suivants:

- 1) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur fonctionne selon Premier Arrivée Premier Servi FIFO.
- 2) Les quatre processus utilisent le même périphérique d'E/S dont la file d'attente est gérée premier arrivée premier servi. L'ordonnanceur du processeur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5.



Session de rattrapage de l'élément du module Méthodes numériques  
durée : 1h 30mn

*Documents Interdits. Utilisation de calculatrice personnelle.*

La qualité et la précision de la rédaction seront des éléments importants d'appréciation.

**Exercice 1 :**

Soit une fonction  $f$  de classe  $C^\infty$  sur  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ , qui possède un point fixe  $\alpha$  et on suppose que :

i)  $\exists k \in ]0, 1[$  tel que  $\forall x \in [a, b]; |f'(x)| < k$ .

ii)  $f^{(i)}(\alpha) = 0$  pour  $i = 1, 2, \dots, m-1$ .

On considère la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $x_0 \in [a, b]; x_{n+1} = f(x_n)$ .

1. Montrer que cette suite converge vers  $\alpha$ .

2. Montrer qu'il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $x_{n+1} = \alpha + (x_n - \alpha)^m \frac{f^{(m)}(c)}{m!}$

3. Qu'elle est l'ordre de convergence de cette méthode permettant de calculer une valeur approchée de  $\alpha$ .

**Exercice 2 :** Soit  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^3$ .

On note  $M_i = \sup_{x \in [-1, 1]} |f^{(i)}(x)|$ , et  $I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$ .

On pose

$$J(f) = \frac{1}{3}(f(-1) + f(1) + 4f(0)) \quad (1)$$

1. a) Montrer que pour tout polynôme  $Q$  de degré inférieur ou égal à 2, on a  $I(Q) = J(Q)$ .

b) Calculer le degré de précision de la formule de quadrature (1).

On note  $P_N(x)$  (respectivement  $P(x)$ ) le polynôme d'interpolation de **Newton** (respectivement de **Lagrange**) de la fonction  $f$  aux abscisses -1, 1 et 0.

2. Ecrire Les fonctions de base conduisant à l'interpolation polynomiale de **Newton** associées aux points -1, 1 et 0, ainsi que le polynôme  $P_N(x)$  dans cette base.

3. Soit  $x \in ]-1, 1[ \setminus \{0\}$ . On pose, pour  $t \in [-1, 1]$ ,

$$g(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x) - P(x)}{x(x^2 - 1)} t(t^2 - 1).$$

a) Montrer qu'il existe  $\xi \in [-1, 1]$  tel que  $g^{(3)}(\xi) = 0$ .

b) En déduire une majoration en fonction de  $M_3$  de l'erreur commise en approximant  $f(x)$  par  $P(x)$  pour  $x \in [-1, 1]$ .

c) Donner une majoration de l'erreur commise en approximant  $I(f)$  par  $J(f)$ .

\*CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

**Examen**  
(Durée : 1h30)

**1) Somme récurrente**

Ecrire un programme en langage C qui lit un entier n et un réel x puis calcule et affiche la somme suivante :

$$S = 1 + x^1/1! + x^2/2! + \dots + x^{(n-2)}/(n-2)! + x^{(n-1)}/(n-1)! + x^n/n!$$

**2) Tableau et fonctions**

Ecrire en langage C les fonctions suivantes :

1. la fonction qui lit un tableau à n éléments ( $1 \leq n \leq 100$ ), de type entier,
2. la fonction qui calcul l'indice du premier plus grand élément du tableau T,
3. la fonction qui insère un élément dans une position donnée, dans le tableau T,
4. la fonction qui supprime un élément d'une position donnée, du tableau T,
5. la fonction qui calcul la somme de tout les éléments du tableau T élevés au carré.
6. la fonction qui affiche les éléments du tableau T.
7. la fonction principale qui utilise les fonctions ci-haut, pour lire un tableau donné par l'utilisateur, l'afficher, puis élever au carré les éléments du tableau, l'afficher de nouveau, ensuite classer les éléments du tableau par ordre croissant, et enfin l'afficher classé.

**3) Chaîne de caractères, allocation dynamique et pointeurs**

Proposer un programme en C qui lit dix phrases (chaînes de caractères) de tailles différentes (minimum 3 caractères, maximum 300 caractères). Les 10 chaînes seront stockées dans un tableau de 10 pointeurs, en réservant dynamiquement l'emplacement en mémoire pour chaque chaîne. Le programme classe ensuite par ordre alphabétique (sur les 3 premiers caractères) les 10 chaînes dans le tableau. Enfin, il les affiche sur l'écran en indiquant le nombre de mots de chaque phrase.

**Facultatif**

Nous utiliserons pour représenter des heures d'une journée au format hh : mm le type Struct temps :

*struct temps*

```
{  
    char jour[20]; /* le champ jour devra contenir un jour de la semaine :  
                   Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi ou Dimanche */  
    int heure;     // le champ heure devra contenir une valeur de 0 à 23  
    int minute;    // le champ minute devra contenir une valeur de 0 à 59.  
};
```

Ecrire un programme en C qui déclare trois variables t1, t2 et t3 de type struct temps en utilisant la structure ci-haut. Le programme demande à l'utilisateur de donner un jour de la semaine, puis deux temps en minutes de cette même journée, et les met dans les variables t1 et t2. Le programme calcule ensuite la somme de t1 et t2 et met le résultat dans t3, et affiche les trois temps selon le format : jour hh:mm. (Attention le jour peut changer si la somme dépasse 23:59).

+CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRESIDENT



Epreuve de Probabilités & Statistique

Juin 2014

(Durée : 1h 30 mn)

**IMPORTANT :**

- Les documents ne sont pas autorisés et les trois exercices sont indépendants.
- On peut traiter chaque question en admettant les résultats précédents s'ils sont nécessaires.

Dans toute l'épreuve,  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  est l'espace probabilisé de base.

**Exercice 1**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que :

$$P(A) = 0.5, \quad P(B) = 0.6, \quad P(A \cup \overline{B}) = 0.7$$

On note  $\overline{E}$  l'événement contraire de  $E$ .

1. Calculer la probabilité  $P(A \cup B)$ .
2. Quelle est la probabilité d'avoir  $A$  sachant que  $B$  n'est pas réalisé ?

**Exercice 2**

1. Soit  $X$  une variable aléatoire réelle de fonction caractéristique  $\Phi_X$ . Soit  $Y = aX + b$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Déterminer la fonction caractéristique de  $Y$  en fonction de  $\Phi_X$ .
2. On suppose que  $X$  est une variable aléatoire exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . La fonction de densité de  $X$  est donnée par

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x), & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- a) Déterminer la fonction caractéristique de  $X$ .
- b) Quelle est la fonction caractéristique de  $Y = 3X + 2$  ?
- c) Quelle est la fonction caractéristique de  $Z = X + Y$  ?

**Exercice 3**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle continue de fonction de densité

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

Soit  $\phi$  la fonction de répartition de  $X$ .

1. a) Définir la fonction caractéristique de  $X$ .  
b) Représenter graphiquement la fonction numérique  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$h(x) = x^2 + 2x$$

2. On définit la variable aléatoire réelle  $Z$  par

$$Z(\omega) = (X(\omega))^2 + 2X(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

- a) Déterminer la fonction de répartition de  $Z$  en fonction de  $\phi$ , notée  $G(z)$ .
- b) En déduire la fonction de densité de  $Z$ , notée  $g(z)$ .
- c) Calculer l'espérance mathématique de  $Z$ .
- d) Quelle est la probabilité  $p_0$  de l'événement  $B = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } Z(\omega) > 0\}$  ?

Application numérique : On donne  $\phi(2) = 0.98$ .

(On rappelle pour toute fin utile que  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ).

Bon travail !

**EXAMEN DE RATRAPAGE**  
**Probabilités & Statistique**  
**Juin 2014**  
(Durée : 1h 30 mn)

**IMPORTANT :**

- Les documents ne sont pas autorisés et les trois exercices sont indépendants.
- On peut traiter chaque question en admettant les résultats précédents s'ils sont nécessaires.

Dans toute l'épreuve,  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  est l'espace probabilisé de base.

**Exercice 1**

On note  $\bar{E}$  l'événement contraire de  $E$ .

1. Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que :  $P(A) = \frac{3}{4}$  et  $P(B) = \frac{3}{8}$ . Montrer que

$$P(A \cup B) \geq \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad \frac{1}{8} \leq P(A \cap B) \leq \frac{3}{8}$$

2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Pour  $n$  événements  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , montrer que

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1) = 1 - \sum_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$

**Exercice 2** Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires de Bernoulli de paramètres  $p$  et  $p'$  respectivement. On sait que la probabilité d'avoir simultanément  $X$  et  $Y$  égales à 1 vaut  $\frac{1}{6}$ . On pose  $Z = X \times Y$ .

1. Montrer que  $Z$  est une variable aléatoire de Bernoulli, et donner son paramètre.
2. Donner le tableau de la loi conjointe des variables aléatoires  $X$  et  $Y$ .
3. Calculer, en fonction de  $p$  et  $p'$ , la covariance du couple aléatoire  $(X, Y)$ .

**Exercice 3**

Soient  $p$  et  $q$  deux nombres réels strictement positifs. On pose

$$\beta(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

- a) Justifier l'existence de  $\beta(p, q)$ .
- b) En supposant  $q > 1$ , établir la relation de récurrence

$$\beta(p+1, q+1) = \frac{p}{q-1} \beta(p, q)$$

- c) En déduire la valeur de  $\beta(p, q)$  lorsque  $p$  et  $q$  sont des entiers naturels.

2. Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta(p,q)} x^{p-1} (1-x)^{q-1}, & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Vérifier que  $f$  est une fonction de densité.

3. Soit  $X$  une variable aléatoire réelle continue de fonction de densité  $f$ .
- Montrer l'existence de l'espérance mathématique de  $X$ ,  $E(X)$ , et de sa variance  $Var(X)$ .
  - Lorsque  $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ , calculer  $E(X)$  et  $Var(X)$ .

Bon travail !

**EXAMEN FINAL**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
5 Juin 2012 - Durée : 1 H 30 mn

N.B. :

- Les quatre (4) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants !
- Les tables statistiques jointes sont celle de la loi normale centrée-réduite et de Student.

**Exercice 1.** Dans une urne, on a 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire sans remise trois (3) boules de l'urne.

1. Quelle est la probabilité que le plus grand numéro tiré soit le 5 ?
2. Quelle est la probabilité que les trois numéros tirés soient inférieurs ou égaux à 5 ?
3. Quelle est la probabilité que le produit des trois numéros tirés soit pair ?
4. Sachant que deux des boules tirées portent un numéro inférieur à 6, quelle est la probabilité que la troisième boule aussi porte un numéro inférieur à 6 ?

**Exercice 2.** Dans une colonie de vacances, il y a 40 % de filles ; On sait par ailleurs que 60% des enfants savent nager, et que 30 % des filles savent nager. On choisit au hasard un enfant (filles ou garçon).

On note  $F$  l'événement : "L'enfant choisi est une fille". Et on note  $N$  l'événement : "L'enfant choisi sait nager".

Pour un événement  $A$ , on note  $\bar{A}$  l'événement contraire.

1. Calculer  $P(N|F)$  et  $P(F|N)$ .
2. Calculer  $P(\bar{F} \cap \bar{N})$ .
3. L'enfant choisi ne sait pas nager, quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
4. L'enfant choisi est un garçon, quelle est la probabilité qu'il ne sache pas nager ?

**Exercice 3.** 1) Rappeler la définition de la fonction génératrice des moments pour une variable aléatoire (notée  $X$ ).

2) En utilisant la fonction génératrice des moments pour une loi binomiale  $B(n; p)$ , retrouver son espérance mathématique et sa variance.

**Exercice 4.** Dans la société "2K-Maroc1", le poids d'une boîte de pois est supposé suivre une loi normale notée  $X$ . Pour en déterminer les paramètres, une étude statistique a été effectuée sur un échantillon de 101 boîtes ; Et les résultats de cette étude ont été regroupés comme suit : (données en Décagrammes)

Intervalles	[20;24]	[24;28]	[28;32]	[32;36]	[36;40]	[40;44]
Effectifs	8	20	30	28	$n_5$	6

1. Déterminer l'effectif de la classe  $]36; 40]$ .
2. Quelle est la classe modale de cette série statistique ?
3. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation du poids moyen théorique d'une boîte de pois. (on donnera le résultat avec trois chiffres après la virgule)
4. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de l'écart-type du poids d'une boîte de pois. (on donnera le résultat avec trois chiffres après la virgule)
5. Donner l'intervalle de confiance à 95 % pour le poids moyen théorique d'une boîte de pois.
6. Donner l'intervalle de confiance à 88 % pour la proportion, notée  $p$ , des boîtes ayant un poids entre 28 et 36 décagrammes.

\*\*\*\*\*

Bon courage

+CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

**EXAMEN FINAL**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**

7 Juin 2013 - Durée : 1 H 30 mn

N.B. :

- Les quatre (4) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants!
- Les tables statistiques jointes sont celle de la loi normale centrée-réduite et de Student.

**Exercice 1.** On choisit au hasard une des trois urnes, notées respectivement  $A$ ,  $B$  et  $C$ ; La probabilité de choisir  $B$  est le double de celle de choisir  $A$ , alors que celle de choisir  $C$  est le triple de celle de choisir l'une ou l'autre entre  $A$  et  $B$ . On sait par ailleurs que  $A$  contient 16 boules blanches et 4 boules noires, et que  $B$  contient 20 boules dont 8 sont noires, alors que  $C$  contient 6 boules noires et 8 boules blanches.

On tire simultanément deux boules de l'urne choisie; ces boules sont noires. Quelle est la probabilité que l'on ait choisi l'urne  $B$ ?

**Exercice 2.** (Une "presque" question de cours!!)

1) Rappeler la définition de la fonction caractéristique pour une variable aléatoire (notée  $X$ ).

**Remarque :** On précisera autant que possible les notations utilisées.

2) En utilisant la fonction caractéristique pour une variable aléatoire exponentielle (de densité de probabilité  $f(x) = \theta e^{-\theta x}$  pour  $x \geq 0$ ), retrouver son espérance mathématique et son écart-type.

**Exercice 3.** Le directeur de la Société "EHCRAM" annonce, sur la base d'un sondage effectué auprès de 700 clients, que la proportion de satisfaits concernant le nouveau produit "Yahala" se situe entre 65,44% et 70,56%.

1. Combien de clients, approximativement, se sont déclarés satisfaits lors du sondage en question?
2. Quel est, approximativement, le seuil de confiance que l'on peut associer à l'intervalle annoncé par le directeur de "EHCRAM"?

**Exercice 4.** La société "Bois-100" désire demander le label 'Haut de Gamme' pour le nouveau produit 'LOLALOCA'; pour ce faire, le service commercial réalisa une série de tests de résistance avant cassure à des planches choisies au hasard. Les données ont été regroupées dans le tableau suivant :(on note  $X$  la variable aléatoire représentant la résistance avant cassure mesurée en  $Kgs/Cm^2$ )

Intervalles	[3;5]	[5;7]	[7;9]	[9;11]	[11;13]	[13;15]	[15;17]
Effectifs	4	12	20	32	18	10	5

N.B. : Les résultats seront donnés avec trois (3) chiffres après la virgule.

1. Estimer le mode de cette série statistique.
2. Estimer la médiane de cette série statistique.
3. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la résistance moyenne théorique, notée  $\mu$ .
4. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance théorique, notée  $\sigma^2$ , de la variable aléatoire  $X$ .
5. Donner l'intervalle de confiance à 90 % pour la résistance moyenne avant cassure pour le produit 'LOLALOCA'.

\*\*\*\*\*

Bon courage

**EXAMEN DE RATRAPAGE**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
(Mardi 19 Juin 2012 \* Durée : 1 H 30)

**N.B. :**

- Les deux exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants!
- Les tables statistiques jointes sont celles de la loi normale centrée-réduite, et de Student.

**Exercice 1. Q.C.M ( Questions à Choix Multiples )**

Pour chacune des suggestions proposées, choisir la ( ou les ) proposition(s) qui est (sont) exacte(s).  
Toute justification serait appréciée à sa juste valeur!!!

1. Dans une population-mère de 1000 individus, le nombre d'échantillons de taille 50 que l'on peut tirer (naturellement et habituellement) est ... :  
a)  $1000^{50}$   
b)  $\frac{1000!}{50!950!}$   
c)  $\frac{1000!}{950!}$   
d) autre valeur.
2. Dans une urne contenant 10 boules blanches et 6 boules noires, on effectue 2 tirages avec remise ; la probabilité de tirer deux boules blanches est égale à :  
a)  $\left(\frac{5}{8}\right)^2$   
b)  $\frac{10}{16}$   
c)  $\frac{1}{10}$   
d) autre valeur.
3. Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $P(A) = 0,6$  ;  $P(B) = 0,7$  et  $P(\bar{A} \cap B) = 0,2$ . Où  $\bar{E}$  désigne l'événement contraire de  $E$ . Parmi les probabilités suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) vraie(s) ? :  
a)  $P(A \cup B) = 0,8$   
b)  $P(A \cap B) = 0,42$   
c)  $P(A \cup B) = 0,9$   
d)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$
4. Pour une variable aléatoire  $X \simeq B(500; 0,4)$ , on a ... :  
a)  $P(X \leq 24) \simeq 0,0015$   
b)  $P(X \geq 24) \simeq 1$   
c)  $P(182 \leq X \leq 218) \simeq 0,9545$   
d)  $P(182 \leq X \leq 218) \simeq 0,9090$
5. Pour une variable aléatoire  $X$  de moyenne théorique  $\mu$  et d'écart-type  $\sigma$ , parmi les inégalités suivantes, celle qui correspond à l'Inégalité de Bienaymé-Tchebycheff est ... :  
a)  $P(\mu - \varepsilon \leq X \leq \mu + \varepsilon) \leq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ .  
b)  $P(|X - \mu| > \varepsilon) \leq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ .  
c)  $P(X - \varepsilon \leq \mu \leq X + \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ .  
d)  $P(X - \varepsilon \leq \mu \leq X + \varepsilon) \leq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ .

\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRESIDENT

T.S.V.P



6. L'intervalle de confiance à 80 % pour une moyenne théorique  $\mu$  dans le cas où l'écart-type  $\sigma$  est connu est approximativement ... :
- $[\bar{x} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
  - $[\bar{x} - 1,645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1,645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
  - $[\bar{x} - 1,28 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1,28 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
  - $[\bar{x} - 0,85 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 0,85 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$

**Exercice 2.** Le directeur de la société "IciLaba", spécialisée dans les services, estime que son entreprise représente un chiffre d'affaires pouvant être considéré comme une variable aléatoire, notée  $X$ , ayant une distribution normale. Pour justifier ses dires, il a pris un échantillon de 101 des agences présentes dans différents pays. Les données sont présentées dans le tableau suivant : (données en  $10^9$  de Dollars US)

Intervalle	[20;24]	[24;28]	[28;32]	[32;36]	[36;40]	[40;48]
Effectifs	6	21	31	28	9	$n_6$

- Déterminer l'effectif de la classe  $]40;48]$ .
- Donner l'estimation du mode de cette série statistique ?
- Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation du chiffre d'affaires moyen pour la société. (on donnera le résultat avec trois chiffres après la virgule)
- Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance de la variable aléatoire représentant le chiffre d'affaires d'"IciLaba". (on donnera le résultat avec trois chiffres après la virgule)
- Donner l'intervalle de confiance à 95 % pour le chiffres d'affaire de la société.
- Donner l'intervalle de confiance à 84 % pour la proportion, notée  $p$ , des agences ayant un chiffre d'affaires supérieur à 32 Milliards de Dollars US.

exosup.com

\*\*\*\*\*

*Bon courage*

**EXAMEN-RATTRAPAGE**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
**5** Février 2014 - Durée : 1 H 30 mn

N.B. :

- Les quatre (4) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants !
- Les tables statistiques jointes sont celle de la loi normale centrée-réduite et de Student.

**Exercice 1.** Soient  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espace probabilité et deux événements  $A$  et  $B$  tels que :  
 $P(A) = 0,6$  et  $P(\bar{A} \cap B) = 0,3$ .  $\bar{E}$  désigne l'événement contraire de  $E$ .

1. Calculer  $P(A \cup B)$  si l'on considère que les événements  $A$  et  $B$  sont incompatibles (disjoints).
2. Calculer  $P(A \cup B)$  si l'on considère que les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants.

**Exercice 2.** On suppose que l'on a, au niveau d'une population supposée infinie, le **quart des adultes** qui a le permis de conduire. Sur un échantillon de 200 personnes, en âge de conduire, on considère la variable aléatoire, notée  $X$ , qui désigne "le nombre de personnes ayant le permis de conduire dans l'échantillon".

1. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  ?
2. Calculer la probabilité qu'il y ait, dans l'échantillon considéré, entre 42 et 73 personnes qui ont le permis de conduire.

**Exercice 3.** A l'Université "DESTATES", une étude, concernant la note obtenue à l'examen de fin de premier semestre, a été réalisée ; Les données sont présentées dans le tableau suivant :

Intervallés	[0;4]	[4;8]	[8;12]	[12;16]	[16;20]
Effectifs	25	33	47	28	18

N.B. : Les résultats seront donnés avec trois (3) chiffres après la virgule.

1. Estimer le mode de cette série statistique.
2. Estimer la médiane de cette série statistique.
3. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la note moyenne théorique, notée  $\mu$ .
4. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance théorique, notée  $\sigma^2$ , de la variable aléatoire  $X$  en question.
5. Donner l'intervalle de confiance à 95 % pour la note moyenne théorique.
6. Soit  $p$  la proportion d'étudiants ayant une note inférieure ou égale à 8 ; Donner l'intervalle de confiance à 93 % pour  $p$ .

**Exercice 4.** Soit le couple aléatoire  $(X, Y)$  de densité de probabilité conjointe  $f$  définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-x+y} & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^- \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où  $k$  est une constante réelle.


1. Donner la valeur de la constante  $k$  pour que  $f$  soit une densité de probabilité conjointe.
2. Calculer les densités marginales, notées  $f_X$  et  $f_Y$ , associées au couple aléatoire  $(X, Y)$ .
3. Est-ce que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ?

\*\*\*\*\*

*Bon courage*

# Loi Normale

$$F(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$




$u$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7290	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9779	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

$u$	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	4,5
$F(u)$	0,99865	0,99904	0,99931	0,99952	0,99966	0,99976	0,999841	0,999928	0,999968	0,999997

Table 4

Loi de Student



$\alpha$	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001
$1 - \alpha$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99	0,998	0,999
$v = ddl$											
1	0,0000	0,3249	0,7265	1,3764	3,0777	6,3137	12,706	31,821	63,656	318,29	636,58
2	0,0000	0,2887	0,6172	1,0607	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	22,328	31,600
3	0,0000	0,2767	0,5844	0,9785	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	10,214	12,924
4	0,0000	0,2707	0,5686	0,9410	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	7,1729	8,6101
5	0,0000	0,2672	0,5594	0,9195	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5,8935	6,8685
6	0,0000	0,2648	0,5534	0,9057	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,2075	5,9587
7	0,0000	0,2632	0,5491	0,8960	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	4,7853	5,4081
8	0,0000	0,2619	0,5459	0,8889	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	4,5008	5,0414
9	0,0000	0,2610	0,5435	0,8834	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,2969	4,7809
10	0,0000	0,2602	0,5415	0,8791	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,1437	4,5868
11	0,0000	0,2596	0,5399	0,8756	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,0248	4,4369
12	0,0000	0,2590	0,5386	0,8726	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	3,9296	4,3178
13	0,0000	0,2586	0,5375	0,8702	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	3,8520	4,2209
14	0,0000	0,2582	0,5366	0,8681	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	3,7874	4,1403
15	0,0000	0,2579	0,5357	0,8662	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	3,7329	4,0728
16	0,0000	0,2576	0,5350	0,8647	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	3,6861	4,0149
17	0,0000	0,2573	0,5344	0,8633	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,6458	3,9651
18	0,0000	0,2571	0,5338	0,8620	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,6105	3,9217
19	0,0000	0,2569	0,5333	0,8610	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,5793	3,8833
20	0,0000	0,2567	0,5329	0,8600	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,5518	3,8496
21	0,0000	0,2566	0,5325	0,8591	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,5271	3,8193
22	0,0000	0,2564	0,5321	0,8583	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,5050	3,7922
23	0,0000	0,2563	0,5317	0,8575	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,4850	3,7676
24	0,0000	0,2562	0,5314	0,8569	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	3,4668	3,7454
25	0,0000	0,2561	0,5312	0,8562	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,4502	3,7251
26	0,0000	0,2560	0,5309	0,8557	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,4350	3,7067
27	0,0000	0,2559	0,5306	0,8551	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,4210	3,6895
28	0,0000	0,2558	0,5304	0,8546	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,4082	3,6739
29	0,0000	0,2557	0,5302	0,8542	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,3963	3,6595
30	0,0000	0,2556	0,5300	0,8538	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,3852	3,6460
40	0,0000	0,2550	0,5286	0,8507	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,3069	3,5510
50	0,0000	0,2547	0,5278	0,8489	1,2987	1,6759	2,0066	2,4033	2,6778	3,2614	3,4960
60	0,0000	0,2545	0,5272	0,8477	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,2317	3,4602
70	0,0000	0,2543	0,5268	0,8468	1,2938	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479	3,2108	3,4350
80	0,0000	0,2542	0,5265	0,8461	1,2922	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387	3,1952	3,4164
90	0,0000	0,2541	0,5263	0,8456	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316	3,1832	3,4019
100	0,0000	0,2540	0,5261	0,8452	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259	3,1738	3,3905
200	0,0000	0,2537	0,5252	0,8434	1,2858	1,6525	1,9719	2,3451	2,6006	3,1315	3,3398
$\infty$	0,0000	0,2533	0,5244	0,8416	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0903	3,2906

**EXAMEN FINAL**  
**DE PROBABILITÉS & STATISTIQUE**  
12 Janvier 2014 - Durée : 1 H 30 mn

N.B. :

- Les quatre (4) exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre, et ils sont indépendants !
- Les tables statistiques jointes sont celle de la loi normale centrée-réduite et de Student.

Exercice 1. Soient  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espace probabilité et deux événements  $A$  et  $B$  tels que :  
 $P(A) = 0,6$   $P(B) = 0,4$  et  $P(A \cup B) = 0,8$ .

1. Quelle est la probabilité d'avoir  $A$  et de ne pas avoir  $B$  ?
2. Quelle est la probabilité de ne pas avoir  $A$  sachant que l'on a  $B$  ?

Exercice 2. On a deux urnes  $U_1$  et  $U_2$  ; l'urne  $U_1$  contient 6 boules rouges et 10 boules vertes, et l'urne  $U_2$  contient 4 boules vertes et 12 boules blanches. On lance un dé équilibré, si le résultat est plus grand que quatre (4), on choisit de tirer la boule de  $U_1$ , sinon on tire la boule de  $U_2$ . A l'issue d'un tirage de boule, on constate que la boule tirée est verte ; Quelle est la probabilité que l'urne utilisée soit  $U_1$  ?

Exercice 3. Lors d'une étude sur la résistance d'un alliage constituant une barre métallique, on a mesuré le poids supporté avant cassure d'un échantillon de tiges. Les données ont été regroupées dans le tableau suivant : (on note  $X$  la variable aléatoire représentant la résistance avant cassure mesurée en  $Kgs/cm^2$ )

Intervalles	[4;8]	[8;12]	[12;16]	[16;20]	[20;24]	[24;28]	[28;32]
Effectifs	6	12	20	34	21	14	4

N.B. : Les résultats seront donnés avec trois (3) chiffres après la virgule.

1. Quelle est la classe modale ?
2. A quelle classe appartient la médiane ?
3. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la résistance moyenne théorique, notée  $\mu$ .
4. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance théorique, notée  $\sigma^2$ , de la variable aléatoire  $X$  en question.
5. Donner l'intervalle de confiance à 90 % pour la résistance moyenne avant cassure.
6. Soit  $p$  la proportion de tiges ayant une résistance avant cassure variant entre 16 et 23  $kgs/cm^2$  ; Donner l'intervalle de confiance à 88 % pour  $p$ .

Exercice 4. Soit le couple aléatoire  $(X, Y)$  de densité de probabilité conjointe  $f$  définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin x \times \cos y & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où  $D$  est le domaine de définition de  $f$ .

1. Entre les "pavés"  $[-\frac{\pi}{2}; 0] \times [0; \frac{\pi}{2}]$  et  $[0; \frac{\pi}{2}] \times [0; \frac{\pi}{2}]$ , quel est celui qui représente le domaine de définition  $D$  de  $f$  ? Justifier la réponse.
2. Calculer les densités marginales, notées  $f_X$  et  $f_Y$ , associées au couple aléatoire  $(X, Y)$ .
3. Est-ce que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ?

\*\*\*\*\*

Bon courage

1

+ CLUB NAJAH+  
UCD.FS.ELJADIDA/  
LE PRÉSIDENT



## Epreuve de probabilité et statistique

Durée : 1H30mn

### Exercice 1

Soit  $X$  un caractère quantitatif mesuré sur une population  $\Omega$  de cardinal  $N$ , et  $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$  une partition de  $\Omega$ . On pose pour  $i = 1, 2, 3$ :

$f_i = n_i/N$ ,  $n_i = \text{card}(\Omega_i)$ , et  $m_i$  désigne la moyenne arithmétique de  $X$  sur  $\Omega_i$ .

- 1) Rappeler la définition de la moyenne arithmétique  $\bar{x}$  de  $X$  sur  $\Omega$ .
- 2) i) Exprimer  $\bar{x}$  en fonction des  $f_i, m_i, i = 1, 2, 3$ , tout en justifiant votre réponse.

ii) Calculer la valeur de  $f_1$  et  $f_2$ , si  $f_3 = 0.4$  et  $m_1 = 10, m_2 = 30, m_3 = 20, \bar{x} = 24$ .

- 3) On suppose que  $\Omega_1 = (5 \leq X \leq 7), \Omega_2 = (7 < X \leq 9), \Omega_3 = (9 < X \leq 14)$ ,

$$n_1 = 50, n_2 = 80, n_3 = 40, m_1 = 6, m_3 = 10.$$

- a) Tracer l'histogramme.
- b) Evaluer une estimation des quantiles  $q_{0,1}, q_{0,5}$  d'ordres respectifs 0,1 et 0,5.
- c) Estimer le nombre d'individus de la sous-population  $\Omega' = (q_{0,1} \leq X \leq q_{0,5})$ .
- d) Déterminer la moyenne arithmétique de  $X$  sur  $\Omega_2$  pour que  $\bar{x}$  soit égale à la médiane.

### Exercice 2

On rappelle que la fonction gamma d'Euler est définie pour  $a > 0$  par :  $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$ .

Soit  $a, b > 0$  et  $X$  une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{T}, P)$  et qui admet une fonction densité :

$$f(x) = \begin{cases} bx^{a-1}e^{-2x}, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Pour  $a = 1$ , calculer la probabilité de l'événement  $(X \geq 2)$ .
- 2) Déterminer  $b$  à l'aide de la fonction  $\Gamma$ .
- 3) Calculer la moyenne et la variance de  $X$  en fonction de  $a$ .

\*CLUB NAJAH\*  
UCC.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT



## Epreuve de Probabilité et Statistique

Durée : 1h30mn

### Exercice 1

On considère le tableau suivant qui représente l'observation de deux caractères quantitatifs  $x$  et  $y$  sur une population donnée :

$x$	-1.5	-1.3	-1	-0.7	-0.5	0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9
$y$	3.5	3	1.8	1.6	0.7	0.1	0.3	1,1	1,4	2,2	2,2

- 1) Calculer la moyenne arithmétique et la variance de  $x$ ,  $x'$  et  $y$ , où  $x' = |x|$ .
- 2) Evaluer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire de  $y$  et  $x$ . Commenter.
- 3) Calculer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire de  $y$  et  $x'$ . Commenter.
- 4) Proposer une courbe de régression de  $y$  en  $x$ .

### Exercice 2

Soit  $X$  une variable aléatoire de loi normale  $N(m, \sigma^2)$  de densité :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp - \frac{(x - m)^2}{2\sigma^2}$$

On pose  $Y = \frac{X-m}{\sigma}$ .

- 1) Expliciter la densité de  $N(0,1)$ .
- 2) Exprimer la fonction de répartition de  $Y$  à l'aide de celle de  $X$ , et montrer que  $Y$  suit  $N(0,1)$ .
- 3) Calculer la moyenne et la variance de  $Y$ .
- 4) En déduire la moyenne et la variance de  $X$ .
- 5) On suppose que  $X$  est la longueur d'une catégorie de tiges métalliques dans un magasin, et que  $m = 100, \sigma^2 = 0,1$ . Calculer le pourcentage de tiges dont la longueur est inférieure à 100.

\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRESIDENT

## Epreuve de probabilité et statistique

-Session de rattrapage-

Durée : 1H30mn

### Exercice 1

Soit  $X$  un caractère quantitatif défini sur une population  $\Omega$ . Les données obtenues à partir de la mesure de  $X$  sur une sous-population  $\Omega'$  de  $\Omega$  sont disposées sous forme d'une série classée  $[a_0, a_1], [a_1, a_2], [a_2, a_3], [a_3, a_4]$  d'effectifs respectifs 5, 10, 6, 2.

1) On suppose que les sept valeurs 5, 6, 6, 10, 10, 11, 12 représentent les mesures de  $X$  sur  $\Omega - \Omega'$ . Calculer une estimation de la moyenne arithmétique, la variance et la médiane de  $X$  sur  $\Omega$ , et ceci à partir de la série classée  $[a_0, a_1], [a_1, a_2], [a_2, a_3], [a_3, a_4]$ , si  $a_0 = 5$ ,  $a_1 = 7$ ,  $a_2 = 9$ ,  $a_3 = 13$  et  $a_4 = 15$ .

2) Soit  $Y$  un autre caractère quantitatif défini sur  $\Omega$ .

a) Si  $Y = -2X + 5$ , montrer que le coefficient de corrélation linéaire de  $Y$  et  $X$  est égal à  $-1$ .

b) Déterminer la droite d'ajustement linéaire de  $Y$  en  $X$  si  $\bar{x} = 10$ ,  $\bar{y} = -15$ ,  $\sigma_X^2 = 2$  et  $\text{cov}(X, Y) = -3$ .

### Exercice 2

Soit  $X$  une variable aléatoire de loi exponentielle de densité

$$f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour un réel  $a$  on désigne par  $[a]$  la partie entière de  $a$ , c'est à dire :  $[a] \leq a < [a] + 1$ .

On pose  $Y = [X]$  ;

1) Calculer la probabilité de l'événement  $(X < 1)$ , et en déduire celle de  $(Y = 0)$ .

2) Déterminer la loi de  $Y$ .

3) Evaluer la fonction génératrice de  $Y$ .

4) En déduire la moyenne et la variance de  $Y$ .

\*CLUB NAJAH\*  
UCD.FS.ELJADIDA  
LE PRÉSIDENT

Examen Rattrapage: Electricité 2 : Filières : SMA3 - SMI3

Durée : 1h 30 min

Exercice 1 : (11 pts)

Champs  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  créés par un conducteur cylindrique plein.

Les sources du champ magnétique sont en pratique souvent réalisées par des courants circulant dans des fils conducteurs. Considérons la distribution *un fil conducteur de longueur supposée infinie et de section circulaire (de rayon  $R$ )*, parcouru par un courant ( $I$ ) de densité  $\vec{J}$  supposée uniforme :

$$\vec{J} = \begin{cases} J \vec{e}_z, & \text{pour } \rho \leq R \\ \vec{0}, & \text{pour } \rho > R \end{cases}$$

On exprime les champs  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  dans la base des coordonnées cylindriques :  $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$

1. Quels sont les propriétés de symétries et d'invariances de cette distribution de courant.
2. Quelle est la forme des lignes de champ de  $\vec{B}$  ?
3. Après identification des plans de symétrie et d'antisymétrie pour la distribution  $\Sigma$ , donner les formes de  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$ .
4. Par application du **théorème d'Ampère**,  
Déterminer :  $\vec{B}_{ex}$  (pour  $\rho > R$ ) et  $\vec{B}_{in}$  (pour  $\rho \leq R$ ).
5. Etudier la continuité du champ  $\vec{B}$  en  $r = R$ .
6. Etablir la relation qui relie le flux de  $\vec{B}$  et la circulation de  $\vec{A}$ .
7. Compte tenue des symétries de  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  ; **choisir un contour d'intégration (C) adéquat**. Calculer la circulation de  $\vec{A}$  le long de ce contour et le flux de  $\vec{B}$  à travers la surface (C) qui s'appuie sur ce contour (C).
8. En déduire  $\vec{A}_{ex}$  (pour  $\rho > R$ ) et  $\vec{A}_{in}$  (pour  $\rho \leq R$ ).  
Prendre le potentiel de référence à une distance donnée du fil, par exemple  $A_z(\rho = 0) = 0$ .
9. Représenter les graphes de B et de A

Questions Facultatifs :

*Application : Câble coaxial*

Une ligne coaxiale est réalisée à l'aide d'un **fil conducteur central cylindrique** de section circulaire (rayon  $R_1$ ) entouré d'un **deuxième conducteur coaxial** (rayon intérieur  $R_2$  et rayon extérieur  $R'_2$ ).

Les deux conducteurs sont séparés par le vide. Le **conducteur central** est parcouru par un courant ( $I$ ) de densité  $\vec{J}$  dont le retour est assuré par le **conducteur périphérique**. Les densités de courants sont supposés uniformes.

- 1- Donner les expressions de  $\vec{J}$  en fonction de ( $\rho$ ) pour.
- 2- ( $\rho \leq R_1$ ) ; ( $R_1 \leq \rho \leq R_2$ ) ; ( $R_2 \leq \rho \leq R'_2$ ) ; ( $\rho > R'_2$ )
- 3- Par application **du théorème d'Ampère**, déterminer les expressions du champ magnétique  $\vec{B}$  et  $\vec{A}$  en tout point de l'espace.

## Exercice 2 : (9 pts)

On considère le circuit représenté ci-contre.

On donne :  $e(t) = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$   
 $R = 40\Omega$ ,  $L = 0,2H$ ,  $C_1 = 5\mu F$

1. Déterminer le courant  $i(t)$  qui traverse le circuit.

$$i(t) = I_m \cos(100\pi t + \varphi)$$

2. Calculer le facteur de puissance



Calculer la puissance moyenne  $P$  consommée dans le circuit.

Il est recommandé d'améliorer le facteur de puissance. Pour cela on ajoute un condensateur ( $C_2$ ) en dérivation (parallèle) avec la capacité ( $C_1$ ) dans la branche entre A et B.

3. En utilisant la représentation de Fresnel ;  
 Donner la valeur de la capacité ( $C_2$ ) qui permet d'obtenir un facteur de puissance égal à 1 ?.

4. Donner l'expression du courant  $i_1(t)$  qui traverse la capacité ( $C_1$ ). Utiliser Diviseur de tension

5. En déduire l'expression du courant  $i_2(t)$  qui traverse la capacité ( $C_2$ ).



Examen: Electricité 2 : Filières : SMA3 - SMI3


Durée : 1h 30 min

**Exercice 1 : (12 pts)**

1. En utilisant le **théorème de Norton** ;

Déterminer le courant complexe ( $\underline{i}_L$ ) ; qui circule dans la bobine pure (**Branche AB**) de la figure ci-contre, en fonction de  $\underline{e}_1$ ,  $\underline{e}_2$ ,  $\underline{\eta}_3$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$  et de la pulsation  $\omega$ .

On transforme d'abord les générateurs de tension en générateurs de courant.



2. Retrouver l'expression de  $\underline{i}_L$  par application du **théorème de Thevenin**.

3. Retrouver l'expression de  $\underline{i}_L$  par application du **théorème de Millman**.

**Exercice 2 : (8 pts)**


1. Calculer le champ magnétique créé en un point M par un *fil rectiligne* ; de longueur finie  $AB = 2L$  parcouru par un courant  $I$  ; en un point M de sa médiatrice.  $M (x=L ; 0)$

2. En déduire l'expression du champ magnétique créé par un *fil rectiligne indéfini* parcouru par le courant  $I$  en un point M de sa médiatrice.  $M (x=L ; 0)$

3. Quels sont les propriétés de symétries et d'invariances de cette distribution de courant dans le cas un *fil rectiligne indéfini* ?


4. Quelle est la forme des lignes de champs magnétiques passant par le point M.

5. Retrouver l'expression du champ magnétique résultant par application du **théorème d'Ampère**.



On considère un fil conducteur de Longueur  $8L$  parcouru par un courant  $I$  qui forme une spire carrée ABCD de côté  $2L$ .

6. Déterminer l'expression du champ magnétique qui règne au point M.  $M (x=L ; 0)$  situé au centre de la spire.



### Examen de rattrapage d'Analyse 3

Durée 3h

**Exercice 1.** Considérons la suite numérique  $(u_n)_n$  définie par :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^{n+1}}, \quad n \geq 1, \alpha > 0.$$

1. Montrer que  $\sum_n u_n$  converge absolument si et seulement si  $\alpha > 1$ .
2. Posons  $v_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ ,  $w_n = u_n - v_n$ ,  $n \geq 1$ .
  - a) Calculer l'expression de  $w_n$  pour  $n \geq 1$ .
  - b) Montrer que  $\sum_n w_n$  converge si  $\alpha > \frac{1}{2}$  et diverge si  $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ .
3. Montrer que  $\sum_n u_n$  converge si  $\alpha > \frac{1}{2}$  et diverge si  $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ .

**Exercice 2.** Soit  $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f_n(x) = \frac{n^\alpha x^2}{n^2 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, n \geq 1, \alpha \in \mathbb{R}.$$

1. Déterminer les valeurs de  $\alpha \in \mathbb{R}$  pour lesquelles  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que la série  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$  si et seulement si  $\alpha < -1$ .
3. Supposons  $\alpha \in [-1, 1[$ . Posons  $f(x) = \sum_n f_n(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .
  - i) Soit  $a > 0$ . Montrer que  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $[-a, a]$ .
  - ii) En déduire que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
4. Supposons que  $\alpha \in [0, 1[$ . Montrer que  $\sum_n f_n$  ne converge pas uniformément sur  $\mathbb{R}$ .

T.S.V.P.



---

**Exercice 3.** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  définie, pour  $\alpha >$ , par :

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \log(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que  $f$  est continue au point  $(0, 0)$  pour tout  $\alpha > 0$ .
2. Déterminer les valeurs de  $\alpha > 0$  pour lesquelles les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$  existent.
3. Supposons  $\alpha > \frac{1}{2}$ . Montrer que  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$ .

**Exercice 4.** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = x^3 + y^2 - 2xy + x - 2y + 1$$

1. Vérifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
2. Déterminer les points critiques (extrémaux) de  $f$ .
3. Ecrire la formule de Taylor de  $f$  à l'ordre 2 au point  $(1, 2)$ .
4. Montrer que  $f$  présente un minimum local au point  $(1, 2)$ .

## Examen d'Analyse 3

Durée 3h

**Exercice 1.** Considérons la série entière réelle  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ , de terme général  $a_n$  défini par :

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 3, \quad \text{et} \quad a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

1. Vérifier par récurrence que  $|a_n| \leq 4^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Soit  $R$  le rayon de convergence de cette série entière. Montrer que si  $|x| < \frac{1}{4}$ , alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  converge absolument. En déduire que  $R \geq \frac{1}{4}$ .
3. Posons  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  pour  $x \in ]-R, R[$ .
  - a) Montrer que  $(2x^2 - 3x + 1)S(x) = 1$  pour tout  $x \in ]-R, R[$ .
  - b) Posons  $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ . Calculer  $P(\frac{1}{2})$ . En déduire que  $R \leq \frac{1}{2}$ .
4. Soit  $f(x) = \frac{1}{1 - 3x + 2x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}, 1\}$ .
  - i) Donner le développement en série entière de  $f$  au point 0 en précisant l'intervalle de convergence.
  - ii) En déduire l'expression de  $a_n$  et la valeur de  $R$ .

**Exercice 2.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $2\pi$ -périodique, paire, vérifiant :  
 $f(x) = (\pi - x)^2$  si  $x \in [0, \pi]$ .

1. Tracer le graphe de  $f$  sur l'intervalle  $[-3\pi, 3\pi]$ .
2. Déterminer la série de Fourier associée à  $f$ .
3. Montrer que la série de Fourier de  $f$  converge normalement sur  $[-\pi, \pi]$ .  
En déduire que :

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = (\pi - x)^2 \quad \forall x \in [0, \pi].$$

4. Calculer la somme des séries suivantes :

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad \text{c) } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}.$$

T.S.V.P.

---

**Exercice 3.** Soit  $D = ]0, +\infty[ \times ]0, +\infty[$ . Soit  $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  vérifiant :

$$(1) \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2yx^2}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in D.$$

Soit  $\varphi : D \longrightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $\varphi(x, y) = (xy, \frac{y}{x}) = (u, v)$ , et soit  $g : D \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y) = g \circ \varphi(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

1. Déterminer la matrice jacobienne de  $\varphi$ . Montrer que  $\varphi : D \longrightarrow D$  est un difféomorphisme de classe  $\mathcal{C}^1$ .
2. Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $D$ .
3. Calculer les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$  en fonction des dérivées partielles  $\frac{\partial g}{\partial u}(u, v)$  et  $\frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$ .
4. Montrer que l'équation (??) est équivalente à :

$$(2) \quad \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{1}{1 + v^2}, \quad (u, v) \in D.$$

5. Déterminer les solutions de l'équation (??). En déduire les solutions de l'équation (??).

## Examen d'Analyse 3

Durée 3h

**Exercice 1.** Considérons la série entière réelle  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ , de terme général  $a_n$  défini par :

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad n \geq 1.$$

1. Déterminer le rayon de convergence  $R$  de cette série entière.
2. Etudier la convergence sur le bord du disque de convergence.
3. Calculer  $S(x)$  pour  $x \in ]-R, R[$ .

**Exercice 2.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $2\pi$ -périodique, paire, vérifiant :  
 $f(x) = \sin x$  si  $x \in [0, \pi]$ .

1. Tracer le graphe de  $f$  sur l'intervalle  $[-3\pi, 3\pi]$ .
2. Déterminer la série de Fourier associée à  $f$ .
3. Montrer que la série de Fourier de  $f$  converge. En déduire que :

$$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{\cos 2px}{4p^2 - 1} = \sin x \quad \forall x \in [0, \pi].$$

4. Calculer la somme des séries suivantes :

$$\text{a) } \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{4p^2 - 1} \quad \text{b) } \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{4p^2 - 1} \quad \text{c) } \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(4p^2 - 1)^2}.$$

T.S.V.P.

---

**Exercice 3.** Soit  $D = ]0, +\infty[ \times ]0, +\infty[$  et  $U = ]0, +\infty[ \times ]0, \frac{\pi}{2}[$  deux parties de  $\mathbb{R}^2$ . Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  vérifiant :

$$(1) \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{x}, \quad (x, y) \in D.$$

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $\varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ , et  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $g(r, \theta) = f \circ \varphi(r, \theta)$ ,  $(r, \theta) \in U$ .

1. Déterminer la matrice jacobienne de  $\varphi$ . Montrer que  $\varphi : U \rightarrow D$  est un difféomorphisme de classe  $\mathcal{C}^1$ .
2. Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$ .

i) Calculer les dérivées partielles  $\frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta)$  et  $\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta)$  en fonction de  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

ii) En déduire les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$  en fonction des dérivées partielles  $\frac{\partial g}{\partial r}$  et  $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ .

3. Montrer que l'équation 1 est équivalente à :

$$(2) \quad r \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) = \operatorname{tg} \theta, \quad (r, \theta) \in U.$$

4. Déterminer les solutions de l'équation 2. En déduire les solutions de l'équation 1.

## Examen de rattrapage d'Analyse 3

Durée 3h

**Exercice 1.** Considérons la suite numérique  $(u_n)_n$  définie par :

$$u_n = \frac{(-1)^n \sin n}{\sqrt{n} + \log n}, \quad n \geq 1.$$

1. Montrer que la série  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}}$  est divergente.
2. Vérifier que  $|\sin n| \geq \sin^2 n \quad \forall n \geq 1$ . En déduire que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|\sin n|}{\sqrt{n}}$  diverge.
3. Montrer que  $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$  diverge.
4. Montrer que  $\left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \sin k \right| \leq \frac{1}{\cos \frac{1}{2}}, \quad \forall n \geq 1$ . En déduire que  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$  converge.

**Exercice 2.** Soit  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une suite de fonctions définie par :

$$f_n(x) = \frac{(-1)^n x^2}{n(n+x^2)} \quad x \in \mathbb{R}, n \geq 1.$$

1. Montrer que  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}$ .
2. Posons  $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
3. Soit  $a \in ]0, +\infty[$ .
  - i) Montrer que  $\sum_{n=1}^{+\infty} f'_n$  converge normalement sur  $[-a, a]$ .
  - ii) En déduire que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. La série  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$  converge-t-elle normalement sur  $\mathbb{R}$  ?

T.S.V.P.



---

**Exercice 3.** Considérons la fonction  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \log(1 + x + x^2), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Donner le développement en série entière au voisinage du point  $a = 0$  de la fonction  $h(x) = \frac{1}{1 - x^3}$ . Préciser l'intervalle de convergence.
2. Montrer que :

$$f'(x) = \frac{1 + x - 2x^2}{1 - x^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} (x^{3n} + x^{3n+1} - 2x^{3n+2}) \quad \forall x \in ]-1, 1[.$$

3. En déduire le développement en série entière de  $f$  au point  $a = 0$  en précisant l'intervalle de convergence.

### Examen : Analyse III

Durée 3 heures

**Exercice 1.** Considérons la série entière  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ , de terme général  $(a_n)_n$  défini par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} a_0 = 0, a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{pour } n \geq 2. \end{cases}$$

Soit  $R$  le rayon de convergence de cette série entière.

1. Montrer que  $0 \leq a_n \leq 2^{n-1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

2. Montrer que si  $|z| < \frac{1}{2}$ , alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  converge absolument. En déduire que  $R \geq \frac{1}{2}$ .

3. Posons  $S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  pour  $z \in D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} / |z| < R\}$ .

i) Montrer que  $S$  vérifie l'équation :

$$(1 - z - z^2)S(z) = z, \quad \forall z \in D(0, R).$$

ii) Vérifier que  $\lambda = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$  est une racine du polynôme  $P(z) = 1 - z - z^2$ . En déduire que  $R \leq \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = |\lambda|$ .

4. Déterminer le développement en série entière de  $g(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$ .

**Exercice 2.** Soit  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$  fixé. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , périodique de période  $2\pi$ , paire vérifiant  $f(x) = \cos \alpha x$  si  $x \in [0, \pi]$ .

1. Déterminer la série de Fourier associée à  $f$ .

2. Montrer que  $f$  est dérivable par morceaux sur  $[-\pi, \pi]$ . En déduire que :

$$\frac{\sin \alpha \pi}{\alpha \pi} + \frac{2\alpha}{\pi} \sin \alpha \pi \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos nx = \cos \alpha x, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

3. Montrer que

$$\frac{\pi}{\sin \alpha \pi} = \frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}.$$

En déduire que :

$$\frac{\pi^2}{\sin^2 \alpha \pi} = \frac{1}{\alpha^2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^2 + n^2}{(\alpha^2 - n^2)^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\alpha - n)^2}.$$

Exercice 3. On se propose de trouver toutes les fonctions de classe  $\mathcal{C}^2$  qui vérifient l'équation :

$$(1) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 4.$$

Soit  $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  l'application définie par :

$$\varphi(x, y) = (u, v) = (x + y, x - y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Montrer que  $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  est un difféomorphisme de classe  $\mathcal{C}^2$ .
2. Soit  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  vérifiant l'équation (1). Considérons l'application  $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$F(u, v) = F \circ \varphi(x, y) = f(x, y)$$

- a) Montrer que l'application  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- b) Calculer  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$  en fonction des dérivées partielles de  $F$ .
- c) En déduire que l'équation (1) est équivalente à :

$$(2) \quad \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}(u, v) = 1.$$

3. i) Résoudre l'équation (2).  
ii) En déduire toutes les solutions de l'équation (1).

**Examen**  
**(1h30)**

**Exercice 1**

Le Liber abaci (ou Liber abbaci) est un livre de Leonardo Fibonacci écrit en 1202. Dans cet ouvrage, Fibonacci présente les chiffres arabes et le système d'écriture décimale positionnelle qu'il avait appris en étudiant auprès de savants arabes à Béjaïa au Maghreb où son père, Guglielmo Bonaccio, travaillait en tant que marchand (wikipedia).

Dans ce livre il décrit la croissance d'une population de lapins sous forme d'une suite que l'on a appelée suite de Fibonacci. Les 13 premiers termes de la suite sont : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. On peut définir la suite comme suit :

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = 1$$

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \text{ pour } n \geq 2$$

Écrire un programme en langage C qui permet de calculer et afficher le terme  $u_n$  de cette suite en utilisant de préférence une fonction récursive.

**Exercice 2**

Le système d'écriture décimale positionnelle se base sur l'écriture polynomiale qui se généralise comme suit : pour un nombre  $N$  écrit en base  $b$  sous forme  $N=(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$  avec les  $a_i \in \{0,1,2,\dots,b-2,b-1\}$ , son équivalent en base décimale est le nombre obtenu avec la forme polynomiale :

$$N = \sum_{i=0}^n a_i \times b^i$$

Le cas de la base binaire  $b=2$  les  $a_i \in \{0,1\}$

Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur de donner le nombre  $N$  écrit en base 2.  $N$  en binaire sera lu par le programme comme un texte (à stocker dans un tableau de caractères). Le programme compte et affiche le nombre de caractères de  $N$  en binaire. Ensuite il converti  $N$  à la base décimale et affiche le résultat en utilisant la forme polynomiale.

Exemple :

L'ordinateur :                      l'utilisateur :

Donner  $N$  en binaire :            1011011

$N$  contient 7 chiffres

(dans ce cas  $N$  en décimal =  $2^6+2^4+2^3+2^1+2^0$ )

$N$  en décimal = 91

**Exercice 3**

En mathématiques, de nombreuses suites ou séries convergent vers  $\pi$  ou vers un multiple de  $\pi$ . Parmi celle-ci se trouve la *série zêta de Riemann*, laquelle peut être définie comme suit:

$S_n = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + \dots + 1/n^2$ . Quand  $n$  est grand  $S_n$  tend vers  $\pi^2/6$

Ecrire un programme en langage C qui demande à l'utilisateur un nombre entier  $n$  et calcule et affiche la somme  $S_n$ .

**Exercice 4 Facultatif**

Ecrire un programme qui crée une matrice de taille 128x128 de type « unsigned char » qui contient des raies horizontales blanches (255) de taille 8 pixels, espacées de 8 pixels noirs (0). La matrice sera stockée sur le disque dur sous forme de fichier (image) nommé raies.img.

## Examen (Durée : 2h00)

### I- Approximation de 2 par une série

On approche le nombre 2 à l'aide de la série

$$S = 1/2^0 + 1/2^1 + 1/2^2 + \dots + 1/2^N$$

Avec N tendant vers une grande valeur.

Ecrire en langage C le programme, qui demande à l'utilisateur de donner un nombre N grand, puis calcule et affiche la somme S qui approxime 2, puis l'erreur d'approximation.

### II- Trie de tableau à l'aide de fonctions

Ecrire en langage C les fonctions suivantes:

1. qui lit un tableau à n éléments ( $1 \leq n \leq 100$ ), de type entier,
2. qui calcul l'indice du premier plus grand élément du tableau T,
3. qui insère un élément dans une position donnée, dans le tableau T,
4. qui supprime un élément d'une position donnée, du tableau T,
5. qui affiche les éléments du tableau T.

Ecrire le programme principal en langage C qui déclare un tableau à n éléments ( $1 \leq n \leq 100$ ) entiers, puis lit le tableau, le classe par ordre croissant et l'affiche en utilisant les fonctions précédentes.

### III- Extensions de fichier


Ecrire un programme en langage C saisissant un nom de fichier et affichant séparément le nom du fichier et l'extension. (le code ASCII du point . peut s'obtenir en écrivant : '.')

Par exemple : pour le nom de fichier : **exercice1.c** le programme affiche **exercice1** c.

pour le nom de fichier : **rapport.doc** le programme affiche **rapport** doc.

### Partie facultative : Matrice et image

Ecrire un programme qui crée une matrice de taille 32x32 de type unsigned char qui contient le dessin suivant :



La matrice sera stockée dans le disque dur sous forme de fichier nommé image.brut.

Les cellules blanches ont la valeur 255, et les cellules noires la valeur 0.

**Examen**  
(Durée : 2h00)

**EXERCICE 1**

Ecrire un programme en C qui demande à l'utilisateur de taper un entier N et qui calcule u(N) défini par :

$$u(0)=3$$

$$u(1)=2$$

$$u(n)=n.u(n-1)+(n+1).u(n-2)+n$$

(Utiliser de préférence une fonction récursive)

**EXERCICE 2**

On considère la suite hongroise :  $u(0)=a$  (a entier)

si  $u(n)$  pair alors  $u(n+1)=u(n)/2$  sinon  $u(n+1)=3*u(n)+1$

Pour toutes les valeurs a, il existe un entier N tel que  $u(N)=1$  (conjecture admise).

a) Ecrire un programme en C qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de  $u(n)$  de  $n=1$  à  $n=N$ .

**EXERCICE 3**

On veut convertir un nombre décimal en binaire (mot de 8 bits) selon la méthode suivante:

Premièrement : tant que le nombre décimal est différent de zéro, on le divise par deux et on met le reste de la division dans un tableau (de taille 8).

Deuxièmement : on inverse les éléments du tableau.

1. Ecrire une fonction *metazero* qui met à zéro les éléments d'un tableau.

2. Ecrire une fonction *inverser* qui permet d'inverser les éléments d'un tableau.

3. Ecrire une fonction *convertir* qui permet de convertir un nombre décimal en binaire en utilisant les deux fonctions précédentes.

4. Ecrire une fonction *affiche* qui affiche les éléments d'un tableau sous forme d'un nombre binaire.

5. Ecrire le programme principal qui demande un nombre et l'affiche en binaire 8bits

Exemple: le nombre 13 vaut 00001101 en binaire

Méthode de division successive	13		2					
	1		6		2			
			0		3		2	
					1		1	
							2	
						1		0

Les prototypes des fonctions:

void metazero(int \*tab, int nb);

void inverser(int \*tab, int nb);

void convertir (int dec, int \*tab, int nb);

void affiche (int \*tab, int nb);

(Sachant que nb est le nombre d'éléments du tableau c.à.d. = 8)

**EXERCICE 4**

Proposer un programme en C qui lit dix phrases (chaînes de caractères) de tailles différentes (minimum 3 caractères, maximum 300 caractères). Les 10 chaînes seront stockées dans un tableau de 10 pointeurs, en réservant dynamiquement l'emplacement en mémoire pour chaque chaîne. Le programme classe ensuite par ordre alphabétique (sur les 3 premiers caractères) les 10 chaînes dans le tableau. Enfin, il les affiche sur l'écran en indiquant le nombre de mots de chaque phrase.

Le code ASCII de l'espace vide entre les mots est 8 (backspace).

Le code ASCII des caractères alphabétiques en majuscules est compris entre 65 (A) et 90 (Z)

Le code ASCII des caractères alphabétiques en minuscules est compris entre 97 (a) et 122 (z)

## Examen (Durée : 2h00)

### EXERCICE 1

Ecrire un programme en C qui demande à l'utilisateur de taper un entier N et qui calcule  $u(N)$  défini par :

$$u(0)=3$$

$$u(1)=2$$

$$u(n)=n.u(n-1)+(n+1).u(n-2)+n$$

(Utiliser de **préférence** une fonction récursive)

### EXERCICE 2

On considère la suite hongroise :  $u(0)=a$  (a entier)

si  $u(n)$  pair alors  $u(n+1)=u(n)/2$  sinon  $u(n+1)=3*u(n)+1$

Pour toutes les valeurs a, il existe un entier N tel que  $u(N)=1$  (conjecture admise).

a) Ecrire un programme en C qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de  $u(n)$  de  $n=1$  à  $n=N$ .

### EXERCICE 3

On veut convertir un nombre décimal en binaire (mot de 8 bits) selon la méthode suivante:

Premièrement : tant que le nombre décimal est différent de zéro, on le divise par deux et on met le reste de la division dans un tableau (de taille 8).

Deuxièmement : on inverse les éléments du tableau.

1. Ecrire une fonction *metazero* qui met à zéro les éléments d'un tableau.
2. Ecrire une fonction *inverser* qui permet d'inverser les éléments d'un tableau.
3. Ecrire une fonction *convertir* qui permet de convertir un nombre décimal en binaire en utilisant les deux fonctions précédentes.
4. Ecrire une fonction *affiche* qui affiche les éléments d'un tableau sous forme d'un nombre binaire.
5. Ecrire le programme principal qui demande un nombre et l'affiche en binaire 8bits

Exemple: le nombre 13 vaut 00001101 en binaire

Méthode de  
division  
successive

13		2
1		6
		2
0		3
		2
1		1
		2
1		0

Les prototypes des fonctions:

void metazero(int \*tab, int nb);

void inverser(int \*tab, int nb);

void convertir (int dec, int \*tab, int nb);

void affiche (int \*tab, int nb);

(Sachant que nb est le nombre d'éléments du tableau c.à.d. = 8)

### EXERCICE 4

Proposer un programme en C qui lit dix phrases (chaînes de caractères) de tailles différentes (minimum 3 caractères, maximum 300 caractères). Les 10 chaînes seront stockées dans un tableau de 10 pointeurs, en réservant dynamiquement l'emplacement en mémoire pour chaque chaîne. Le programme classe ensuite par ordre alphabétique (sur les 3 premiers caractères) les 10 chaînes dans le tableau. Enfin, il les affiche sur l'écran en indiquant le nombre de mots de chaque phrase.

Le code ASCII de l'espace vide entre les mots est 8 (backspace).

Le code ASCII des caractères alphabétiques en majuscules est compris entre 65 (A) et 90 (Z)

Le code ASCII des caractères alphabétiques en minuscules est compris entre 97 (a) et 122 (z)



**Exercice 1.** a) Soit  $f$  une fonction positive et décroissante sur l'intervalle  $[1, u]$ ,  $\forall u \geq 1$ . Montrer que la série numérique  $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$  converge si et seulement si l'intégrale généralisée  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  converge.

b) En déduire que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right),$$

est une constante (on ne cherche pas à déterminer explicitement cette constante).

**Exercice 2.** Soit  $(f_k)$  une suite de fonctions définies sur un intervalle  $I$ . On suppose qu'il existe une série numérique  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  à termes positifs  $a_k$ , convergente.

a) Montrer que si

$$\forall x \in I, \quad |f_k(x)| \leq a_k,$$

alors la série de fonctions  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$  converge normalement sur  $I$ .

b) Montrer que si

$$\forall x \in I, \quad |f_k(x) - f_{k-1}(x)| \leq a_k, \quad k \geq 2,$$

alors la suite de fonctions  $(f_k)$  converge uniformément sur  $I$ .

b) Montrer que la limite uniforme d'une suite de fonctions bornées est bornée. Que peut-on dire si la limite est simple ? (justifier la réponse).

Exercice 3. On considère l'équation différentielle

$$xy'' + (2 - x)y' - y = 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

où  $y$  est une fonction de la variable réelle  $x$ .

- Déterminer sous forme de série entière la solution de cette équation différentielle telle que :  $y(0) = 1$ .
- Quel est le rayon de convergence de la série ainsi obtenue?
- Identifier cette solution sous forme d'une fonction classique.

Exercice 4. On considère une fonction  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}$  appartenant à  $C^1(\mathbb{R}^3)$ .

On pose,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = f(\cos x^2, xy, f(x, y, x)).$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de  $F$  par rapport à  $x$  et à  $y$  en un point  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . On exprimera les dérivées partielles de  $F$  en fonction de celles de  $f$ .

N.B. On apportera le plus grand soin à la présentation des calculs ainsi qu'aux commentaires sur les résultats.

EXAMEN  
Janvier 2012  
Durée 1H30

PROBLEME

On veut résoudre le système linéaire  $Ax = b$  avec

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \gamma \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & \delta & \alpha \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

où  $\alpha, \beta, \gamma$  et  $\delta$  sont des paramètres réels.

1) Sous quelles conditions le système  $Ax = b$  admet une solution unique?

On suppose désormais que ce système admet une solution unique.

2) Ecrire la méthode de Jacobi et celle de Gauss-Seidel sous forme de systèmes itératifs pour résoudre  $Ax = b$ .

3) Fournir des conditions nécessaires et suffisantes afin que

a) la méthode de Jacobi converge.

b) la méthode de Gauss-Seidel converge.

4) On prend  $\alpha = \beta = 2$ ,  $\gamma = 0$  et  $\delta = 1$ .

a) Vérifier que la méthode de Gauss-Seidel converge.

b) Calculer par cette méthode la solution du système  $Ax = b$  à  $10^{-1}$  près (solution approximative avec un chiffre exact après la virgule).

5) Trouver la décomposition  $LU$  de la matrice paramétrée  $A$ .

6) En reprenant les valeurs des paramètres de la question 4), retrouver la solution du système  $Ax = b$  par cette méthode  $LU$ .

**Exercice 1.** Développer en série de Fourier la fonction suivante :

$$x \mapsto e^{\cos x} \sin(\sin x).$$

**Exercice 2.** On considère une fonction  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}$  appartenant à  $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$ . On pose,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = f(\cos x^2, xy, f(y, y, y)).$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de  $F$  par rapport à  $x$  et à  $y$  en un point  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . On exprimera les dérivées partielles de  $F$  en fonction de celles de  $f$ .

**Exercice 3.** Soit  $\Omega$  le domaine défini par

$$\Omega = \left\{ z \in \mathbb{C} : |\arg z| \leq \frac{\pi}{4} \right\},$$

et considérons la série complexe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z}{(1+z^2)^k}.$$

- Déterminer le domaine de convergence  $D$  de cette série.
- Montrer que cette série converge absolument sur  $\Omega$ .
- Montrer que cette série ne converge pas uniformément sur  $\Omega$ .
- Montrer que si on multiplie le terme général de cette série par  $(-1)^k$ , il y a alors convergence uniforme sur  $\Omega$ .

**Exercice 4.** 1) (Question de cours). Énoncer et démontrer le critère de comparaison pour les séries numériques.

2) Soit  $(a_k)$  une suite de nombres réels strictement positifs définie par

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_{k+1} = \ln(1 + a_k).$$

- Les séries numériques  $\sum a_k$  et  $\sum a_{k+1}$  sont-elles de même nature? Justifier votre réponse.
- Déterminer le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_k x^k$  et étudier son comportement sur le bord de son intervalle de convergence.

**Exercice 1.** L'objet de cette question est d'établir une condition suffisante de différentiabilité d'une fonction  $f$  de deux variables réelles  $x$  et  $y$ . Montrer que si l'une des dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$  de la fonction  $f$  existe au point  $(a, b)$  et si l'autre dérivée partielle existe dans un voisinage de  $(a, b)$  et que de plus cette dernière est continue en  $(a, b)$ , alors la fonction  $f$  est différentiable en  $(a, b)$ . (Noter que dans ce résultat, la condition suffisante de différentiabilité de  $f$  consiste à utiliser la continuité d'une des dérivées partielles mais pas les deux!).

**Exercice 2.** Etudier la différentiabilité de la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

**Exercice 3.** Déterminer l'intervalle de convergence et la somme de la série entière réelle

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1 + \alpha^k)}{k} x^k, \quad \alpha \neq 0$$

dans chacun des cas suivants :

- a)  $\alpha = 1$ .
- b)  $\alpha = -1$ .
- c)  $|\alpha| \neq 1$ .

**Exercice 4.** On considère la série de fonctions

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^3 kx}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- a) Montrer que cette série converge uniformément sur  $\mathbb{R}$  et désignons par  $S$  la somme de cette série.
- b) Montrer que  $S$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .
- c) Montrer que  $S$  est développable en série de Fourier.
- d) Déterminer explicitement  $S$ .

**Exercice 1.** On considère la série de fonctions  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} f_k$  où

$$f_k(x) = \frac{x}{k^\alpha + x^2 k^{\alpha+\beta}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*.$$

a) Etudier selon les valeurs des paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  la convergence simple de cette série sur  $\mathbb{R}$ .

b) On désigne par  $S$  la somme de cette série. Déterminer une condition (si elle existe) sur les paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  pour que  $S$  soit continue sur  $\mathbb{R}$ .

c) On suppose que la série converge simplement et que  $\alpha + \frac{\beta}{2} \leq 1$ . Etudier la continuité de  $S$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2.** a) Montrer que la fonction  $x \mapsto e^{\cos x} \cos(\sin x)$ , est développable en série de Fourier. Déterminer cette série ainsi que le domaine de convergence uniforme.

b) En déduire, si possible, la valeur de la série numérique  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!}$ .

**Exercice 3.** 1) Montrer que si  $\sum a_k z^k$  (resp.  $\sum (-1)^k a_k z^k$ ) est une série entière complexe de rayon de convergence égal à 1 et si  $a_k \in \mathbb{R}$ ,  $a_k > a_{k+1}$  avec  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ , alors la série  $\sum a_k z^k$  (resp.  $\sum (-1)^k a_k z^k$ ) converge en tout point du bord du disque de convergence sauf peut-être au point  $z = 1$  (resp.  $z = -1$ ).

2) Etudier les séries entières suivantes (rayon de convergence, convergence sur le bord du disque de convergence) :

$$a) \sum \frac{z^{pk}}{k}, \quad b) \sum \frac{(-1)^k}{k \ln k} z^k.$$

**Exercice 4.** Etudier la continuité et la différentiabilité de la fonction  $f$  définie par

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y) = x^2 u(x) + y^2 u(y),$$

où  $u : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $t \longmapsto u(t)$ , est une fonction égale à 1 si  $t \in \mathbb{Q}$  et égale à 0 sinon.

**Exercice 1.** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2$  par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \left( \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4} \right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .
- Cette fonction est-elle de classe  $\mathcal{C}^2$  ? Justifier la réponse.

**Exercice 2.** a) Montrer que le produit infini suivant converge et déterminer sa valeur :

$$\prod_{k=2}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{k^2} \right).$$

- Montrer que l'étude du produit infini  $\prod_{k \in \mathbb{N}^*} a_k$ ,  $a_k > 0$ , se ramène à celle de la série numérique  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \ln a_k$ . De plus, on a  $P = e^S$ , où  $P$  est la valeur de  $\prod_{k=1}^{\infty} a_k$  et  $S$  est la somme de  $\sum_{k=1}^{\infty} \ln a_k$ .

**Exercice 3.** a) Énoncer et démontrer le critère de Weierstrass concernant la convergence normale d'une série de fonctions.

- Montrer que si  $(f_k)$  est une suite de fonctions positive, décroissante et converge uniformément vers 0 alors la série alternée  $\sum (-1)^{k+1} f_k$  converge uniformément sur  $\Omega$ .

- Étudier la convergence uniforme de la série de fonctions

$$\sum \frac{(-1)^k}{2\sqrt{k} + \cos x}.$$

**Exercice 4.** On considère la série entière de somme

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{4k+1}}{(4k+1)!}.$$

- Déterminer le rayon de convergence de cette série et montrer que  $f(x)$  vérifie une équation différentielle linéaire du 3ème ordre à coefficients constants.
- Déterminer explicitement  $f(x)$ .



Examen Rattrapage d'Algèbre  
Durée 3h, Niveau: SMA3

**Exercice 1:** Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que

$$\begin{cases} f^3 - 3f^2 + 2f = 0 \\ f^5 + 16f = 0 \end{cases}$$

- 1) Quel est le polynôme minimal de  $f$
- 2) En déduire la valeur de  $f$

**Exercice 2:** Quelles sont les réduites de Jordan possibles pour:  
- La matrice  $A$  de polynômes caractéristique et minimale respectifs;

$$P_A(X) = (X - 1)^4(X - 2)^2 \text{ et } M_A(X) = (X - 1)^2(X - 2)$$

- La matrice  $B$  de polynômes caractéristique et minimale respectifs;

$$P_B(X) = (X - 1)^5 \text{ et } M_B(X) = (X - 1)^3$$

et dont l'espace propre associé à la valeur propre 1 est engendré par la famille  $\{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0)\}$ .

**Exercice 3:** Soit pour  $m$  un réel, la matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Calculer le polynôme caractéristique de  $A_m$ .
- 2) Quelles sont les valeurs propres de  $A_m$ ? Pour quelles valeurs de  $m$ , la matrice  $A_m$  n'admet que des valeurs propres simples. En déduire que si  $m \notin \{-\frac{1}{2}, 1\}$ , la matrice  $A_m$  est diagonalisable.
- 3) On suppose  $m = 1$ . Calculer  $rg A_1$  et le polynôme minimal de  $A_1$ .  $A_1$  est-elle diagonalisable?
- 4) Montrer qu'il existe deux s.e.v.,  $F_1$  et  $F_2$  tels que  $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$ .
- 5) Déterminer une base de Jordan associée à  $A_1$ .

6) On suppose  $m = -\frac{1}{2}$ . Déterminer les valeurs propres de  $A_{-\frac{1}{2}}$ .  
 $A_{-\frac{1}{2}}$  est-elle diagonalisable.

**Exercice 4:** Soient  $E$  un  $IK$ -espace vectoriel de dimension finie,  $f$  et  $g$  deux formes linéaires sur  $E$  telles que


$$\ker f = \ker g$$

- 1) Montrer qu'il existe  $\alpha \in IK$  tel que  $f = \alpha g$ .
- 2) Montrer que l'ensemble des matrices de traces nulles est un espace vectoriel, déterminer sa dimension.

**Exercice 5:** Soient  $E = IR_3[X]$  et  $B^* = \{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$  la famille des formes linéaires définies sur  $E$  par,

$$\varphi_i(P) = P(i), \text{ pour } i = 0, 1, 2, 3.$$

- 1) Montrer que la famille  $B^*$  forme une base de l'espace dual  $E^*$ .
- 2) Déterminer la base  $B$  de  $E$  dont  $B^*$  est la base duale.



Examen d' Algèbre  
Durée 3h, Niveau: SMA3

**Exercice 1:** Soit  $J$  la matrice  $(n \times n)$  suivante

$$J = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer le rang de  $J$
- 2) Trouver une relation entre  $J$  et  $J^2$
- 3) Endéduire les valeurs propres de  $J$
- 4) Donner le polynôme caractéristique et le polynôme minimale de  $J$
- 5)  $J$  est - elle inversible ?
- 6) Déterminer une base de Jordan associée à  $J$

**Exercice 2:** Soient  $E$  un  $C$  - espace vectoriel et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que

$$f^2 - 3f + 2Id = 0$$

- 1) Montrer que  $f$  est un automorphisme
- 2) On suppose que  $f \neq \lambda Id$ , pour tout  $\lambda \in IN$ . Montrer que

$$E = \ker(f - Id) \oplus \ker(f - 2Id)$$

**Exercice 3:** Soient  $E$  un  $C$  - espace vectoriel de dimension 5 et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que

$$f^2 = 0$$

- 1) Montrer que

$$rg f < \dim \ker f$$

- 2) Montrer que

$$\dim \ker f \in \{3, 4\}$$

- 3) Quelles sont les matrices de Jordan possibles associées à  $f$  ?

**Exercice 4:** Soient  $f_1$  et  $f_2$  deux formes linéaires définies sur  $\mathbb{R}^2$  par,

$$f_1(x, y) = x + y \quad \text{et} \quad f_2(x, y) = x - y$$

- 1) Montrer que  $\{f_1, f_2\}$  forme une base de l'espace dual  $(\mathbb{R}^2)^*$ .
- 2) Déterminer la base de  $\mathbb{R}^2$  dont  $\{f_1, f_2\}$  est la base duale.
- 3) Exprimer les formes linéaires suivantes dans la base  $\{f_1, f_2\}$ ,

$$g(x, y) = x \quad \text{et} \quad h(x, y) = 2x - 6y$$


**Exercice 5:** Soient  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  et  $\varphi$  des formes linéaires sur un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ , de dimension finie. Montrer que

$$\varphi \in \text{Vect}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \quad \Leftrightarrow \quad \bigcap_{i=1}^n \ker \varphi_i \subset \ker \varphi$$

**Application:** Dans  $\mathbb{R}^3$ , donner l'équation du plan  $P$  contenant la droite  $(D)$  d'équations

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$$

et le vecteur  $u = (1, 1, 1)$ .



**EXAMEN - Session normale**

( Janvier 2012 - Durée: 3H )

**EXERCICE 1 :** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ . Calculer  $A^{99}$ .

**EXERCICE 2 :** Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie.

On considère des formes linéaires  $\varphi_1, \dots, \varphi_p \in E^*$ . ( $E^*$  étant l'espace vectoriel dual de  $E$ )

1) Soit l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \phi : E &\longrightarrow \mathbb{C}^p \\ x &\longmapsto \phi(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_p(x)) \end{aligned}$$

Montrer que :

$$\phi \text{ est surjective} \iff \{\varphi_1, \dots, \varphi_p\} \text{ est libre dans } E^*.$$

2) Soit  $\psi \in E^*$  et  $\alpha_k \in \mathbb{C}$ , ( $1 \leq k \leq p$ ).

$$\text{Montrer que : } \psi = \sum_{k=1}^p \alpha_k \varphi_k \iff \bigcap_{k=1}^p \text{Ker}(\varphi_k) \subset \text{Ker}(\psi).$$

**EXERCICE 3 :** On munit l'espace vectoriel  $\mathbb{R}_2[X]$  de sa base canonique  $B = \{1, X, X^2\}$ .

Notons  $B^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$  la base duale de  $B$  dans l'espace vectoriel dual  $(\mathbb{R}_2[X])^*$ .

Sur  $\mathbb{R}_2[X]$ , on définit les formes linéaires  $\psi_1, \psi_2$  et  $\psi_3$  pour tout  $P(X) \in \mathbb{R}_2[X]$  par :

$$\psi_1(P) = \varphi_1(P), \quad \psi_2(P) = P(1), \quad \psi_3(P) = \int_0^1 P(t) dt.$$

1) Montrer que  $C^* = \{\psi_1, \psi_2, \psi_3\}$  est une base de  $(\mathbb{R}_2[X])^*$ .

2) Donner la matrice de passage de la base  $B^*$  à la base  $C^*$ .

3) Déterminer la base  $C = \{P_1, P_2, P_3\}$  de  $\mathbb{R}_2[X]$  dont  $C^*$  est la base duale.

**PROBLEME** : On considère l'espace vectoriel  $\mathbf{R}^5$  muni de sa base canonique  $\mathbf{B}_c = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$

**Partie I.** Soit  $f$  un endomorphisme non nul de  $\mathbf{R}^5$  tel que  $f^2 = 0_{L(\mathbf{R}^5)}$

- 1) Donner le polynôme caractéristique  $P_f(X)$  et le polynôme minimal  $m_f(X)$  de  $f$ .
- 2) a) Montrer que  $\text{rg}(f) < \dim \text{Ker}(f)$ .  
b) Donner les valeurs possibles de  $\dim \text{Ker}(f)$ .
- 3) En déduire les réduites de Jordan possibles de la matrice  $A = M(f, \mathbf{B}_c)$ .

**Partie II.** Dans  $\mathbf{R}^5$ , on considère les vecteurs  $u_i$ ,  $1 \leq i \leq 5$ , définis par :

$$\begin{aligned} u_1 &= e_1, & u_2 &= e_1 + e_2, \\ u_3 &= e_1 + e_2 + e_3, \\ u_4 &= e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \quad \text{et} \\ u_5 &= e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5. \end{aligned}$$

- 1) a) Vérifier que  $\mathbf{C} = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$  est une base de l'e.v  $\mathbf{R}^5$ .  
b) Donner les matrices de passage  $P$  de  $\mathbf{B}_c$  à  $\mathbf{C}$  et  $Q$  de  $\mathbf{C}$  à  $\mathbf{B}_c$ .
- 2) Soit  $g$  un endomorphisme de  $\mathbf{R}^5$  dont la matrice par rapport à la base  $\mathbf{C}$  est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 6 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -4 & -3 & -2 \end{pmatrix} = M(g, \mathbf{C}).$$

- a) Déterminer la matrice  $B = M(g, \mathbf{B}_c)$  de  $g$  par rapport à la base  $\mathbf{B}_c$ .
- β) Trouver le polynôme caractéristique  $P_A(X)$  de la matrice  $A$ .
- γ) Comparer  $P_A(X)$  et  $P_B(X)$ .
- 3) i) Trouver la dimension de chacun des sous-espaces propres  $E_B(\lambda)$  où  $\lambda \in \text{Sp}(B)$ .  
ii) En déduire la forme  $J$  d'une réduite de Jordan de la matrice  $A$ .  
iii) En déduire aussi le polynôme minimal  $m_A(X)$  de  $A$ .
- 4) Donner une base de jordanisation  $\mathbf{B}_J$  adaptée à la forme  $J$ .

EXAMEN-SESSION NORMALE - Janvier 2013

Dans toute la suite  $K$  désigne les corps commutatifs  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

Pour un endomorphisme  $f$  d'un  $K$ -e.v  $E$ , on note  $P_f(X)$  et  $m_f(X)$  ses polynômes caractéristique et minimal respectifs,  $tr(f)$  est la trace de  $f$ .

$E_f(\lambda)$  est le sev propre de  $E$  associé à une valeur propre  $\lambda$  et  $Sp(f)$  désigne le spectre de  $f$ .

**EXERCICE 1 :** Soit  $E$  un  $K$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$ .

Soit  $\{f_1, \dots, f_p\}$  une famille libre dans  $E^*$  (e.v dual de  $E$ ) et soit  $\{u_1, \dots, u_p\}$  une famille de  $p$  vecteurs linéairement indépendants dans  $E$ .

On définit un endomorphisme  $\varphi$  de  $E$  par :

$$\varphi(x) = f_1(x)u_1 + f_2(x)u_2 + \dots + f_p(x)u_p, \text{ pour tout } x \in E.$$

a) Exprimer  $\text{Ker}(\varphi)$  en fonction de  $[\text{sev}\langle\{f_1, \dots, f_p\}\rangle]^\circ$ .

b) En déduire le rang de  $\varphi$ .

**EXERCICE 2 :** Soit  $f \in L(E)$ ,  $E$  étant un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ .

1) Montrer que  $tr(f)$  = somme des valeurs propres de  $f$ .

2) On suppose que  $rg(f) = 1$ .

a) Montrer que 0 est une v.p de  $f$ .

b) En déduire une expression de  $P_f(X)$ .

c) Montrer que :  $f$  est diagonalisable  $\Leftrightarrow tr(f) \neq 0$



### EXERCICE 3 :

Déterminer la forme de Jordan de la matrice suivante et en donner le polynôme minimal :

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 & 2 & -5 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

EXERCICE 4 : Soit  $A \in M_7(\mathbb{R})$  telle que  $P_A(X) = -(X-1)^3(X-2)^4$ .

Donner les réduites de Jordan possibles de la matrice  $A$ , dans les cas suivants :

- 1)  $\dim E_A(1) = \dim E_A(2) = 2$ .
- 2)  $m_A(X) = (X-1)^2(X-2)^3$ .
- 3)  $m_A(X) = (X-1)^2(X-2)^2$ .
- 4)  $\dim E_A(1) = 3$  et  $\dim E_A(2) = 4$ .
- 5)  $m_A(X) = (X-1)(X-2)$ .

EXERCICE 5 : Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$  telle que  $\text{tr}(A) \neq 0$ . On considère l'application :

$$\varphi : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})$$

$$M \longmapsto \varphi(M) = \text{tr}(A)M - \text{tr}(M)A$$

- 1) Montrer que  $\varphi \in L(M_n(\mathbb{K}))$ .
- 2) Soit  $T_1 = \{M \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$  et  $T_2 = \text{sev}\langle A \rangle$ .

Montrer que  $T_1$  et  $T_2$  sont des sev propres de  $\varphi$ .

- 3) En déduire que  $\varphi$  est diagonalisable et écrire la matrice réduite associée à  $\varphi$ .
- 4) Donner le polynôme  $m_\varphi(X)$ .

Examen: Electricité 2 : Filières : SMA3 - SMI3


Durée : 1h 30 min

**Exercice 1 : (12 pts)**

1. En utilisant le **théorème de Norton** ;

Déterminer le courant complexe ( $\underline{i}_L$ ) ; qui circule dans la bobine pure (**Branche AB**) de la figure ci-contre, en fonction de  $\underline{e}_1$ ,  $\underline{e}_2$ ,  $\underline{\eta}_3$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$  et de la pulsation  $\omega$ .

On transforme d'abord les générateurs de tension en générateurs de courant.



2. Retrouver l'expression de  $\underline{i}_L$  par application du **théorème de Thevenin**.

3. Retrouver l'expression de  $\underline{i}_L$  par application du **théorème de Millman**.

**Exercice 2 : (8 pts)**


1. Calculer le champ magnétique créé en un point M par un *fil rectiligne* ; de longueur finie  $AB = 2L$  parcouru par un courant  $I$  ; en un point M de sa médiatrice. M ( $x=L$  ; 0)

2. En déduire l'expression du champ magnétique créé par un *fil rectiligne indéfini* parcouru par le courant  $I$  en un point M de sa médiatrice. M ( $x=L$  ; 0)

3. Quels sont les propriétés de symétries et d'invariances de cette distribution de courant dans le cas un *fil rectiligne indéfini* ?


4. Quelle est la forme des lignes de champs magnétiques passant par le point M.

5. Retrouver l'expression du champ magnétique résultant par application du **théorème d'Ampère**.



On considère un fil conducteur de Longueur  $8L$  parcouru par un courant  $I$  qui forme une spire carrée ABCD de côté  $2L$ .

6. Déterminer l'expression du champ magnétique qui règne au point M. M ( $x=L$  ; 0) situé au centre de la spire.



EXAMEN session de rattrapage  
ELECTROMAGNETISME

question de cours

Etablir l'équation de Maxwell- Faraday  $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{d\vec{B}}{dt} = \vec{0}$


Exercice 1

Un conducteur cylindrique de rayon  $R_1 = a$ , de longueur supposée infinie, d'axe  $\Delta$  parallèle à Oz et traversé par un courant d'intensité I (figure ci-contre).

1. Enoncer le théorème d'Ampère
2. Déterminer l'expression du champ magnétique  $\vec{B}(M)$  créé en tout point M :
  - 2.1. Le point M est à l'intérieur du cylindre,
  - 2.2. Le point M est à l'extérieur du cylindre.
  - 2.3. Le point M est à la surface du conducteur ( $r=a$ )

3. On considère un cadre de forme carrée de côté b (figure ci-contre). Ce cadre est entouré d'un fil conducteur.

Donner le flux du champ magnétique de  $\vec{B}(M)$  à travers la surface du cadre.




4. Le conducteur fait partie d'un câble coaxial. Ce câble est modélisé selon un cylindre infini plein de rayon  $R_1 = a$  (le conducteur cylindrique défini ci-dessus) parcouru par un courant d'intensité +I et deux cylindres infinis coaxiaux de rayons  $R_2 > R_1$  et  $R_3$  tels que l'espace  $R_2 < r < R_3$  délimite un conducteur cylindrique (conducteur 2) parcouru par un courant d'intensité -I. Déterminer le champ magnétique en un point M de l'espace  $R_2 < r < R_3$  (dans le conducteur 2) et  $r > R_3$  (à l'extérieur des conducteurs).

Exercice 2

Le groupement R, L, C parallèle de la figure ci-contre est alimenté par une source de tension de f.é.m  $e = E_m \cos \omega t$ .

On note  $i$  le courant global et  $i_L$  le courant circulant dans la bobine pure.



1. Déterminer l'admittance complexe  $\underline{Y}_{eq}$  du circuit.
2. Déterminer le courant  $\underline{i}_L$  (en notation complexe) en fonction de  $\underline{i}$ ,  $\underline{Y}_{eq}$  et  $\underline{Y}_L$ .
3. Déterminer le déphasage  $\varphi$  de  $\underline{i}_L$  par rapport à  $\underline{i}$  en fonction de R, L C et  $\omega$ .

EXAMEN session normale  
ELECTROMAGNETISME


Exercice 1

On considère le circuit de la figure 1.  
Calculer l'intensité du courant qui circule dans la branche  
comportement  $R$  par deux méthodes :

- 1°) Application du **théorème de Thévenin** ;
- 2°) Application du **théorème de Norton**.

Données :  $\eta_2 = 1A$ ,  $E_1 = 6V$ ,  $R_2 = 2R_1 = R = 100\Omega$

Figure 1



Exercice 2

Un câble coaxial est formé par ;

- Un conducteur filiforme parallèle à  $Z'Z$  est traversé par un courant d'intensité  $I$  (figure 2).
- un conducteur cylindrique d'épaisseur négligeable (donc de rayon  $R$ ), de longueur supposée infinie, d'axe  $Z'Z$ , est traversé par un courant d'intensité  $I$  (dans le sens indiqué par la figure 2)

1. Enoncer le théorème d'Ampère sous sa forme locale et intégrale.
2. Déterminer l'expression du champ magnétique  $\vec{B}(M)$  créé en tout point  $M$  :
  - 2.1. Le point  $M$  ( $r < R$ ) entre le fil et le cylindre,
  - 2.2. Le point  $M$   $r > R$  est à l'extérieur du cylindre.

3. Tracer  $B(r)$ .




figure 2

Exercice 3 :

1°) Déterminer le courant complexe  $\underline{i}_R$  circulant dans la résistance pure (figure 3), en fonction de  $\underline{e}_1$ ,  $\underline{e}_2$ ,  $\underline{\eta}$ ,  $r$ ,  $L$ ,  $C$  et de la pulsation  $\omega$ , en utilisant le **théorème de Norton**.

$\underline{e}_1$ ,  $\underline{e}_2$ ,  $\underline{\eta}$ , en régime sinusoïdal forcé, sont en phase.

2°) Retrouver l'expression de  $\underline{i}_R$  par application du **théorème de Millmann**.




Figure 3

### EXERCICE 1


On considère le circuit ci-contre.

Par application du théorème de Thévenin, calculer l'intensité du courant qui traverse la fém  $E$  et  $R$ . Préciser le sens du courant.

On donne :

$$\eta_1 = 1A, \eta_2 = 2A, E = 1V, R_1 = 10\Omega,$$

$$R_2 = 20\Omega, \text{ et } R = 1\Omega$$




### EXERCICE 2

On considère le circuit de la figure ci-contre.

$$e_1(t) = 2 \cos 2000\pi t,$$

$$e_2(t) = 4 \cos(2000\pi t)$$

$$\eta(t) = 2 \cos 2000\pi t$$




1°) Donner les expressions, en notation complexe, des forces électromotrices :  $\underline{e}_1(t)$ ,  $\underline{e}_2(t)$

2°) Tracer en représentation de Fresnel  $\underline{e}_1(t)$  et  $\underline{e}_2(t)$  pour  $\omega t = \frac{\pi}{4}$ .

3°) Par application du théorème de Norton, déterminer l'expression du courant en notation complexe  $\underline{i}(t)$  qui traverse la charge  $\underline{Z}_C$ .

### Exercice 3

On considère un conducteur cylindrique, sous forme d'un tube, de longueur supposée infinie, de rayon intérieur  $R_1 = 3 \text{ mm}$  et de rayon extérieur  $R_2 = 5 \text{ mm}$ . Il est parcouru par un courant d'intensité  $I = 5 \text{ A}$  dans le sens de sa longueur. Le sens du courant est opposé à  $\vec{e}_z$  (figure ci-contre).



1°) Calculer la norme du vecteur densité de courant  $\vec{J}$ .

2°) Calculer la résistance électrique  $R$  par unité de longueur.

3°) Enoncer le théorème d'Ampère sous sa forme intégrale.

4°) Donner l'expression du théorème d'Ampère sous sa forme locale.

5°) Déterminer l'expression du champ magnétique  $\vec{B}(M)$  en tout point  $M$  de l'espace créé par ce conducteur. Préciser le sens et la direction de  $\vec{B}(M)$ .

6°) Tracer l'allure de  $B(r)$ .

7°) En déduire l'expression du potentiel - vecteur  $\vec{A}(M)$  correspondant.

On donne : la perméabilité magnétique du vide  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

### Question de Cours


Vérifier que l'équation de Maxwell- Ampère dans le vide avec sources est bien compatible avec la loi de conservation de la charge électrique.

Exercice 1 :

On veut calculer la tension  $\mathcal{U}$  dans le circuit représenté par la figure ci-contre. On prend  $V_D = 0$ . Sachant que ( $E = 6V$ ,  $R = 10\Omega$ )


1°) Ecrire d'abord la loi des nœuds en terme de potentiels aux points B et C (exprimer  $V_B$  et  $V_C$ ).

2°) Ensuite, en déduire  $\mathcal{U}$ .



Exercice 2

On considère le circuit représenté ci-dessous.



$$e_1(t) = 2 \cos 2000\pi t,$$

$$e_2(t) = 4 \cos 2000\pi t$$

$$\eta(t) = 2 \cos 2000\pi t$$

$$L = 0,4 \text{ H}, R = 500\Omega, C = 0,4 \mu F,$$

$$r = 10 \Omega \text{ et } \underline{Z} = 500 + j 2512.$$

1°) Exprimer en représentation de Norton le générateur ( $\underline{e}_2(t)$ ,  $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{GH}$ ).

2°) Exprimer en représentation de Thévenin le générateur ( $\underline{\eta}(t)$ ,  $\underline{Z}_r$ ).

3°) Par application du théorème de Thévenin, déterminer l'expression de l'intensité du courant complexe  $\underline{i}$  circulant dans le dipôle d'impédance complexe  $\underline{Z}$  (sans valeurs numériques).

4°) En déduire la valeur de l'intensité efficace correspondante à  $\underline{i}$ .

### Exercice 3 :

On considère un solénoïde parcouru par un courant d'intensité  $I$ . Le solénoïde, de longueur  $l_s$  et de rayon  $R$ , est constitué de  $N$  spires identiques coaxiales et jointives. La densité d'enroulements, qui est le nombre de spires par unité de longueur, est  $n$ .

On se place dans les conditions de l'approximation du solénoïde de longueur infiniment long ( $l_s \gg R$ ).

1) Par **application du théorème d'Ampère**, déterminer l'expression du champ magnétique créé par ce solénoïde en tout point de son intérieur. Préciser sur un schéma aussi le sens  $\vec{B}$ .

2) Déterminer le coefficient d'auto-induction  $L$  de ce solénoïde.

3) Déterminer l'expression de la densité d'énergie magnétique volumique emmagasinée par le solénoïde en fonction de :

3-a)  $L$  et  $I$

3-b)  $\mu_0$  et  $B$ .

### Question de Cours

1°) Donner les expressions des équations de Maxwell dans le vide **avec sources**.

2°) Etablir l'expression du théorème de Poynting dans le vide en l'**absence de sources**.

On donne :  $\text{div}(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{rot} \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{rot} \vec{b}$